

Teave ravimi baklofeen kohta

Ajakirjanduses on korduvalt kajastamist leidnud ravimi baklofeen kasutamine imikutel ja väikelastel.

Mis on baklofeen?

Baklofeen on kesknärvisüsteemi toimiv ravim (gamma-aminovõihappe derivaat), mida kasutatakse täiskasvanutel peamiselt hulgiskleroosist (*Sclerosis multiplex*) ja lastel tserabraalparalüüsist (*Paralysis cereбрalis infantilis*) põhjustatud spastilisuse (ülemäärase lihaspinge) sümptomaatiliseks raviks. Baklofeen ei ravi kumbagi haigust, ent võib parandada muu ravi, nt füsioteraapia, toimet. Baklofeeni on uuritud ka laste gastro-ösofageaalse refluksi (maosisu tagasivool söögitorru) puhul.

Millised on baklofeeni kõrvaltoimed?

Baklofeeni kõrvaltoimed on enamasti mööduvad, pöörduvad ja annusest sõltuvad. Kõrvaltoimed ei teki ravimi kõikidel kasutajatel ja on neil, kellel nad tekivad, erineva raskusega.

Tavalisemad kõrvaltoimed on uimasus, iiveldus, väsimus, lihasnõrkus ja vererõhu langus.

Harva esineb meeleoluhäireid, peavalu, suukuivust ja maitsetundlikkuse häireid, kõhulahtisust või –kinnisust, unetust, nägemishäireid, nahalöövet ja –sügelust, higistamist, urineerimishäireid, veresuhkru taseme tõusu, maksafunktsiooni näitajate muutusi. Baklofeen suurendab maohappe sekretsiooni.

Ravim võib suurendada krambivalmidust ning ravi järsk katkestamine võib põhjustada ärajäämanähte (annust tuleb ravi lõpul vähendada järk-järgult 1-2 nädala jooksul).

Kohe tuleb minna arsti juurde, kui ravimi kasutajal tekib uriini värvuse muutus (tume uriin), minestus, hallutsinatsioonid, tõsine meeleoluhäire (depressioon), kohin kõrvus, nahalööve või –sügelemine.

Üleannustamise tunnuseks on topeltnägemine või hägustunud nägemine, krambid või lihastõmbused, tugev lihasnõrkus, aeglane või jõuetu hingamine, õhupuudus, oksendamine.

Baklofeeni kasutamine Eestis

Baklofeenil ei ole Eestis müügiluba. Sellest tulenevalt ei ole Raviamet hinnanud selle ravimi kvaliteeti, ohutust ega toimivust. Ravim on mitmetes riikides, sh Ameerika Ühendriikides, erinevatel näidustustel kasutusel.

Eestis kasutatakse baklofeeni, nagu ka teisi müügiiloota ravimeid, raviarsti otsuse alusel. Kui arst leiab, et ravim on vajalik ning tema hinnangul on olemas piisavalt teavet ravimi ohutuks kasutamiseks ning loodetav kasu ületab konkreetese patsiendi puhul võimaliku riski, tuuakse ravim kõnealuse patsiendi jaoks Eestisse.

Nagu kõikide müügiiloota ravimite puhul, peaks arst alati patsiendiga, lapse puhul patsiendi vanematega, võimalikku kasu ja ohte, samuti ravimi müügiiloota puudumist ning sellest tulenevat mittemeedikuile mõistetavas vormis arutama. Baklofeeni määramise lapsele peaks otsustama kõrgema etapi raviastutuse kogenud lastearst koos lapsevanematega.

Edasine teave: sam@sam.ee, ajakirjanikele on aadressil www.sam.ee mugav pressipäringu vorm.