

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

**Pakendi infoleht: teave kasutajale**

**Metronidasool  
Vaginaalsuposiidid, 500 mg**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusümptomid on sarnased
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on metronidasool ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne metronidasooli kasutamist
3. Kuidas metronidasooli kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas metronidasooli säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

### **1. Mis ravim on metronidasool ja milleks seda kasutatakse**

Metronidasooli kasutatakse metronidasoolile tundlike algloomade ja mikroorganismide poolt põhjustatud vaginiidi (tupepõletik) ja vulviidi (häbemepõletik) raviks. Vaginaalsuposiit sisaldab 500 mg metronidasooli.

### **2. Mida on vaja teada enne metronidasooli kasutamist**

#### **Ärge kasutage metronidasooli:**

- kui te olete metronidasooli ja teiste imidasoolide suhtes allergiline.

#### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Pikaajalise ravi korral tuleb regulaarselt teha vereanalüüsi (leukopeenia oht).

Ravi tuleb lõpetada pearingluse tekkimisel.

Vaginaalsuposiitide samaaegne kasutamine koos kondoomi või tupepeesaariga võib suurendada nende purunemise riski.

#### **Metronidasool koos alkoholiga:**

Alkoholi tarvitamine on ravi ajal vastunäidustatud.

#### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Metronidasooli ei ole soovitatav raseduse

ja imetamise ajal kasutada.

### **Muud ravimid ja metronidasool**

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Metronidasooli ei soovitata kasutada koos disulfiraami, kaudse toimega antikoagulantide (varfariin) ja mittepolariseerivate müorelaksantidega (veкуроonium) .

### **3. Kuidas metronidasooli kasutada**

Kasutage metronidasooli sisaldavaid suposiite alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab sobiva annuse ja annab teile täpsed juhised.

Tavaline annus on 1 suposiit tuppe panna õhtul enne magamaminekut, lamavas asendis.

Ravi kestus on 7...10 päeva.

Vajadusel kombineeritakse suukaudse raviga.

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

#### **Kui te kasutate metronidasooli rohkem kui ette nähtud:**

Spetsiifilisi üleannustamise sümptome ei ole kirjeldatud.

#### **Kui te unustate metronidasooli kasutada:**

Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata. Jätkake ravimi kasutamist, kuni kõik välja kirjutatud suposiidid on kasutatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka metronidasool põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva esinevad järgnevad kõrvaltoimed: iiveldus, metallimaitse suus, isutus, valu ülakõhus, oksendamine, kõhulahtisus, peavalu, pearinglus, nahalööve või sügelus. Pikaajalise ravi korral suurte annustega võib tekkida leukopeenia ja perifeerne neuropaatia, mis taanduvad ravi lõpetamisel.

Võimalk on uriini värvuse muutus punakas-pruuniks (tingitud metronidasooli metaboliitidega seotud pigmentidest).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kui mistahes kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

### **5. Kuidas metronidasooli säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. LISAINFO**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati koostöölastatud mais 2012**