

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nitroglütseriin

Keelealunesprei 0,4 mg/annuses

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on nitroglütseriin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne nitroglütseriini võtmist
3. Kuidas nitroglütseriini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas nitroglütseriini säilitada
6. Lisainfo

1. Mis ravim on nitroglütseriin ja milleks seda kasutatakse

Nitroglütseriin kuulub orgaaniliste nitraatide rühma ja tal on veresooni laiendav toime, eelkõige veene, vähemal määral artereid ja arterioole ning ka koronaartereid laiendav toime, langetades vererõhku. Ravimit kasutatakse stenokardiahoo (valu- ja pigistustunne rinnus) profülaktikas ja ravis.

2. Mida on vaja teada enne nitroglütseriini võtmist

Ärge võtke nitroglütseriini:

- kui te olete nitroglütseriini või selle ravimi suhtes allergiline
- kui teil on äge vereringepuudulikkus (šokk, kollaps)
- kui teil on väga madal vererõhk (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)
- kui teil on kardiogeenne šokk (kui ei ole tagatud südame vasaku vatsakese piisavalt kõrge diastoolne rõhk)
- kui teil on hüpertroofne obstruktiivne kardiomiopaatia (südame õõned on kitsenenud), adhesiivne perikardiit või perikardi tamponaad
- kui teil on primaarne kopsu hüpertensioon, eriti koronaarteritõbe põdevatel patsientidel
- kui te kasutate samaaegselt erektsioonihäirete raviks mõeldud fosfodiesteraasi inhibiitoreid (nt Viagra)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne nitroglütseriini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil esineb madala täitumisrõhuga äge südamelihaseinfarkt
- kui teil on kalduvus madalale vererõhule (tuleb vältida süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg)
- kui teil esineb aortaal- ja/või mitraalstenosis (südameklappide ahenemine)

- kui teil on ortostaatilise hüpotensiooni (kehaasendist sõltuv vererõhu langus) oht
- kui teil on haigusi, millega kaasneb kõrgeenenud koljusisene rõhk (kuigi edasist koljusisese rõhu tõusu on täheldatud vaid nitroglütseriini suurte annuste veenisisesel manustamisel)

Muud ravimid ja nitroglütseriin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Nitroglütseriini vererõhku langetav toime võib tugevneda kui võtate samaaegselt teisi veresooni laiendavaid ravimeid (vasodilataatorid), vererõhku langetavaid (antihüpertensiivsed) ravimeid, kaltsiumikanalite blokaatoreid, beeta-adrenoblokaatoreid, neuroleptikume, tritsüklilisi antidepressante või kui kasutate samaaegselt fosfodiesteraasi inhibiitorit sildenafiliil (Viagra) või alkoholi.

Kasutamisel koos dihidroergotamiiniga (DHE) võib nitroglütseriin suurendada DHE taset ja seetõttu suurendada selle vererõhku tõstvat toimet.

Hepariini ja nitroglütseriini kooskasutamine nõrgendab hepariini toimet.

Patsientide puhul, keda on eelnevalt ravitud orgaaniliste nitraatidega (nt isosorbiiddinitraat, isosorbiid-5-mononitraat), võib olla vajalik soovitud mõju saavutamiseks suurendada nitroglütseriini annust.

Rasedus ja imetamine

Nitroglütseriini kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole kliinilisi andmeid. Kui olete rase või planeerite raseduda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nitroglütseriin võib halvendada tähelepanuvõimet ja reaktsioonikiirust, eriti koostoides alkoholiga, mistõttu ravi ajal nitroglütseriiniga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid ega mehhanisme.

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

3. Kuidas nitroglütseriini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab sobiva annuse ja annab teile täpsed juhised.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nitroglütseriini pihustatakse suuõõnde stenokardiahoo alguses või vahetult enne olukordi, mis kogemuse põhjal võib stenokardiahoo esile kutsuda. Vastavalt seisundi raskusele pihustada 1...2 annust aerosooli suuõõnde 30 sekundiliste vahedega.

Enne iga kasutuskorda tuleb spreipudelil eemaldada kaitsekork, tõmmates seda vertikaalselt ülespoole. Enne esimest kasutamist (vajadusel ka siis kui pihustit ei ole kaua kasutatud) on vajalik spreipudeli annuselugemise kamber täita, milleks vajutatakse esmalt klappi (vajutage pihustiotsik tugevasti maksimaalselt alla, seejärel vabastage) ja pihustatakse sisu õhku, kuni väljub ühtlane ravimijuga. Nüüd on pihusti kasutamiskvalmis ning vajab esmalt loksutamist.

Pihustamise ajal hoida ravimipudelit püstiasendis otsik ülespoole!

Lahust pihustatakse suhu järgmiselt:

- hingake sisse sügavalt
- hoidke hinge kinni
- pihusti otsiku ava asetada suule võimalikult lähedale (ava on kergesti kombatav ning teda võib seetõttu kasutada pudeli asendi usaldusväärse määrana, kui pihustit kasutada öösel)
- vajutage doseerimispumbale, pihustage lahust keele alla.
- **Ravimit ei tohi sisse hingata!**
- pange suu kinni ja hingake järgnevad 30 sekundit läbi nina
- peale manustamist asetatakse kaitsekork kindlalt oma kohale tagasi

Kui te kasutate nitroglütseriini rohkem kui ettenähtud

Üleannustamisel võivad esineda vererõhu langus koos ortostaatilise regulatsiooni häiretega (tunne, et te liigute ise või liigub teie ümbrus) ning reflektorse südame löögisageduse kiirenemisega (tahhükardia) ja peavalu, nõrkus, pearinglus, iiveldus, oksendamine ning kõhulahtisus. Suurte annuste (üle 20 mg/kg) korral võivad tekkida methemoglobineemia, tsüanoos, düspnoe ja tahhüpnoe põhjustatuna nitroglütseriini ainevahetuse käigus moodustuvate nitriti ionide poolt. Väga suurte annuste korral võib esineda sümptomaatiline koljusisese rõhu tõus.

Kui on tekkinud üleannustamise sümptomid, tuleb konsulteerida koheselt arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravi algperioodil võivad sageli esineda nitraadist põhjustatud peavalud, mis ravi jätkamisel tavaliselt mööduvad.

Nitroglütseriini esmakordsel kasutamisel või annuse suurendamisel võib tekkida vererõhu langus ja/või ortostaatiline hüpotensioon. Sellega võib kaasneda südametegevuse reflektorne kiirenemine, unisus, pearinglus ja nõrkus. Harva võivad esineda iiveldus, oksendamine, mööduv nahapunetus ja allergiline nahareaktsioon. Harva võivad vererõhu suure languse korral tugevneda stenokardia sümptomid (paradoksaalne nitraadireaktsioon). Harva on täheldatud kollapsit, mõnikord koos südame arütmia, südametegevuse aeglustumise (bradüarütmia) ja minestusega.

Üksikjuhtudel on täheldatud eksfoliativset dermatiiti.

On esinenud tolerantsust ja ristuvat tolerantsust teiste nitroühendite suhtes.

Kestval kasutamisel vaibub hemodünaamiline toime 24 tunni jooksul.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas nitroglütseriini säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Lisainfo

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2013