

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Tabletid, 600mg
Prasikvanteel

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis toime on prasikvanteelil
2. Mida on vaja teada enne ravimi võtmist
3. Kuidas ravimit võtta
4. Võimalikud prasikvanteeli kõrvaltoimed
5. Kuidas ravimit säilitada
6. Lisainfo

1. MIS TOIME ON PRASIKVANTEEELIL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravimi toimeaine prasikvanteel on suu kaudu hästi imenduv isokinoliini derivaat. Põhjustab parasiidi lihastes motoorse lõpp-plaadikese piisava depolarisatsiooni ja sellega kutsub esile parasiidi lihaskonnas spastilise (krampliku) halvatus. Suuremates annustes ka surmab parasiidi.

Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse 1-2 tunni möödudes. Ravitoime saavutamiseks on vajalik 4-6 tunni (maksimaalselt 10 tundi) vältel hoida ravimi kontsentratsiooni plasmas 0,19mg/l.

Prasikvanteel läbib hematoentsefaalset barjääri. Rinnapiimas on 20-25% vereseerumis olevast ravimi kontsentratsioonist. Prasikvanteel metaboliseeritakse maksas ning see eritub neerude kaudu. 90% kogu kontsentratsioonist eritub 24 t jooksul. Neerude puudulikkuse korral aeglustub eritumine ja maksafunktsiooni häire korral häirub prasikvanteeli metaboliseerumine,

Prasikvanteeli kasutatakse teatud helmintooside e nugiusshaiguste (parasiitusside poolt põhjustatud haiguste) raviks, näiteks tenioos (paelusstõbi) (k.a tsüstitserkoos), difüllobotrioos (laisstõbi), hümenolepiaasi (kääbuspaelusstõbi), skistosomoosi (kakssuulastõbi) ja maksa imiussinfektsioonid.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RAVIMI VÕTMIST

Ärge võtke prasikvanteeli sisaldavat ravimit

- Kui te olete allergiline (ülitundlik) prasikvanteeli või ravimi mõne koostisosa suhtes
- Kui teil on silma tsüstitserkoos
- Koos rifampitsiiniga
- Kui te olete rase ja/või toidate last rinnaga
- Patsient, kes on alla 4-eluaasta vana

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Manustamisel koos deksametasooni, karbamasepiini või fenütoiiniga tugevneb prasikvanteeli toime. Prasikvanteeli biosaadavus väheneb tsimetidiiniga koosmanustamisel.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna prasikvanteeli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid ohutuse kohta, ei soovitata kasutada raseduse esimesel trimestril ravimeid, mis sisaldavad prasikvanteeli.

Prasikvanteel eritub rinnapiima, mistõttu ühekordsel manustamisel tuleb imetavatel naistel rinnaga toitmine katkestada 72 tunniks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Prasikvanteel võib põhjustada uimasust, seetõttu pärast ravikuuri lõppu tuleb hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest 24 t jooksul.

3. KUIDAS RAVIMIT VÕTTA

Võtke ravimit, mis sisaldab prasikvanteeli alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Prasikvanteeli annuse määrab teile arst, sõltuvalt teie haiguse tüübist

- tenioosi raviks 10mg/kg ühekordselt suukaudselt
- difüllobotrioosi ja hümenolepiaasi raviks 25mg/kg ühekordselt suukaudselt
- skistosomoosi ja maksa imiussinfektsioonide raviks 20-25mg/kg kolm korda päevas 4-6 tunniste intervallidega ühe päeva jooksul suukaudselt

Tablett tuleb alla neelata tervelt. Tabletti ei tohi katki närida.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka prasikvanteeli sisaldav ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid: peavalu, pearinglus, unisus, ebamugavustunne kõhus, iiveldus. Võib esineda oksendamist, kõhulahtisust. On kirjeldatud ka allergilisi reaktsioone (palavik, nõgestõbi, nahalööve).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS RAVIMIT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage ravimit, mis sisaldab prasikvanteeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Infoleht on viimati koostöölastatud märtsis 2009