

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Klindamütsiin, 20mg/g, vaginaalkreem

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist
3. Kuidas klindamütsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas klindamütsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine klindamütsiin on antibiootikum, mis omab toimet tupe ja häbeme infektsioone põhjustavate mikroorganismide vastu. Klindamütsiini vaginaalkreem on näidustatud tupe ja häbeme põletiku raviks.

2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist

Ärge kasutage klindamütsiini:

- kui olete klindamütsiini, linomütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
- kui teil on anamneesis antibiootikumidest tingitud koliit.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne klindamütsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on põletikuline soolehaigus, nt Crohni tõbi või haavandiline koliit.

Kui teil tekib ravi ajal klindamütsiiniga kõhulahtisus, siis pöörduge arsti poole. Antimikroobse ravi ajal või pärast seda tekkiv kõhulahtisus võib viidata soolepõletikule (pseudomembranoossele koliidile). Pseudomembranoossest koliidist on teatatud peaaegu kõigi antibakteriaalsete ainete (muuhulgas ka klindamütsiini) kasutamise korral ning selle raskusaste võib varieeruda kergest kuni eluohtlikuni. Mõõduka raskusastmega kõhulahtisuse korral võib seisund paraneda pärast ravimi kasutamise lõpetamist.

Pseudomembranoosse koliidi tekkimisel tuleb ravi klindamütsiiniga lõpetada ning arst määrab sobiva antibakteriaalse ravi. Soole peristaltikat pärssivate ravimite (nt loperamiid) kasutamine on vastunäidustatud.

Enne klindamütsiiniga ravi alustamist on soovitatav, et teid kontrollitakse vastavate laborianalüüsidega ka teiste infektsioonide (muuhulgas *Trichomonas vaginalis*, *Candida albican*, *Chlamydia trachomatis* ja gonokokkinfektsioonid) suhtes.

Klindamütsiini kasutamine võib põhjustada ravimile mittetundlike mikroorganismide, eriti pärmseente liigset vohamist.

Klindamütsiini sisaldava vaginaalkreemi kasutamise ajal ei ole muude vaginaalsete toodete (näiteks tampoonide ja tupeloputusseadmete) kasutamine soovitatav.

Lapsed ja noorukid

Ravimi kasutamise efektiivsust ja ohutust ei ole lastel uuritud.

Muud ravimid ja klindamütsiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Puuduvad andmed klindamütsiini samaaegse kasutamise kohta teiste vaginaalsete ravimitega. Klindamütsiini sisaldavat vaginaalkreemi manustatakse lokaalselt, mistõttu satub seda organismi süsteemselt tõenäoliselt ainult vähesel määral. Kuid süsteemselt manustataval klindamütsiinil on neuromuskulaarset ülekannet blokeerivaid omadusi, mistõttu võib see tugevneda teiste neuromuskulaarset ülekannet blokeerivate ravimite toime. Klindamütsiini kasutamisel samaaegselt neuromuskulaarset ülekannet blokeerivate ravimitega on vajalik ettevaatus.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos klindamütsiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Klindamütsiini kasutamine ei ole soovitatav raseduse esimesel trimestril, sest puuduvad esimese trimestri ajal rasedatega läbiviidud piisavad ja hästi kontrollitud uuringud.

Kliinilistes uuringutes ei ole klindamütsiini sisaldavate vaginaalsete preparaatide kasutamine rasedatel teise trimestri ajal ning klindamütsiinfosfaadi süstemne kasutamine teise ja kolmanda trimestri ajal seostunud kaasasündinud väärarenditega.

Klindamütsiini võib kasutada raseduse teisel ja kolmandal trimestril, kui see on vältimatult vajalik.

Imetamine

Ei ole teada, kas pärast vaginaalkreemi kasutamist eritub klindamütsiin rinnapiima. Teatatud on aga suu kaudu ja parenteraalselt manustatava klindamütsiini leidumisest rinnapiimas. Seetõttu tuleb klindamütsiini vaginaalkreemi kasutamisel rinnaga toitmise ajal hinnata kasu ja riski suhet emale.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et klindamütsiini sisaldav vaginaalkreem mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas klindamütsiini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täpsed annustamisjuhised annab raviarst.

Tavapäraselt manustatakse ööseks 5 g vaginaalkreemi tuppe 3-7 järjestikkusel öhtul.

Kui te Kasutate klindamütsiini rohkem kui ette nähtud

Klindamütsiin võib vaginaalse üleannustamise korral imenduda koguses, mis põhjustab süsteemseid toimeid.

Ravimi juhuslik allaneelamine võib põhjustada toimeid, mis on võrreldavad suukaudse klindamütsiini terapeutiliste kontsentratsioonidega.

Kui te olete manustanud klindamütsiini liiga palju ja teil tekivad ravimi kõrvaltoimed, siis pöörduge arsti poole.

Kui te unustate klindamütsiini kasutada

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate klindamütsiini kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Klindamütsiin on antibiootikum. Antibiootikumravi korral tuleb ravikuur alati lõpuni teha, ka siis, kui teie sümptomid on taandunud. Ravi enneaegsel lõpetamisel võib teie haigus uuesti süveneda. Kuid ravi korduval alustamisel võivad haigustekitajad antibiootikumile tundetuks muutuda (ravimresistentsus) ja teie haigust ei saa enam klindamütsiiniga ravida.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Klindamütsiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

Infektsioonid ja infestatsioonid
Seeninfektsioon (sh kandidiaas)

Närvisüsteemi häired
Peavalu

Seedetrakti häired

Kõhuvalu

Kõhulahtisus

Iiveldus

Oksendamine

Pseudomembranoosne koliit (avaldub muuhulgas kõhulahtisusena) on kõikidele antibakteriaalsetele ainetele omane kõrvaltoime.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sügelus (mujal kui manustamiskohas)

Lööve

Neerude ja kuseteede häired

Neeruvaagna põletik
Valulik urineerimine

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Tupeseeen
Tupevalu
Tupeinfektsioon
Eritis tupest
Menstruaaltsükli häired

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Manustamiskoha valu
Manustamiskoha sügelus
Manustamiskoha lokaalne turse
Palavik

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas klindamütsiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2019.