

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lorasepaam, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on lorasepaam ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne lorasepaami kasutamist
3. Kuidas lorasepaami kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas lorasepaami säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on lorasepaam ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine lorasepaam kuulub bensodiasepiinide rühma.

Lorasepaami kasutatakse orgaaniliste psüühikahäirete, psüühooaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete, skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete, meeleoluhäirete ning neurootiliste, stressiga seotud ja somatoformsete häirete jm psüühikahäirete korral.

Müügiloata lorasepaami väljakirjutamise õigus on ainult psühhiaatril.

2. Mida on vaja teada enne lorasepaami kasutamist

Ärge kasutage lorasepaami:

- kui olete lorasepaami, mõne teise bensodiasepiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on raskeid hingamis- või rinnaõõne häireid
- kui teil esineb tugev lihaste väsimus või nõrkus – seisund nimega myasthenia gravis
- kui teil on raske maksahaigus
- kui teil esineb une ajal hingamishäireid – seisund nimega uneapnoe
- kui te toidate last rinnaga, kuna lorasepaam võib erituda rinnapiima (vt lõik „Rasedus ja imetamine“ allpool).

Kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, ärge võtke lorasepaami ja pöörduge oma arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne lorasepaami kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui te olete rase või planeerite rasedumist (vt lõik „Rasedus ja imetamine“)
- kui teil on diagnoositud isiksusehäire; see võib tähendada, et teil on suurem võimalus jääda lorasepaamist sõltuvusse
- kui teil on olnud püsivat alkoholi ja/või ravimite kuritarvitamist

- kui teil on probleeme neerude või maksaga
- kui teil on varem esinenud depressiooni, kuna see võib lorasepaamravi ajal taastekkida
- kui teil on depressioon, kuna lorasepaam võib suurendada enesetapumõtete tekkimise tõenäosust
- kui teil on esinenud psühhoosi
- kui teil on esinenud krampe
- kui teil on hingamishäireid
- kui teil on koordinatsioonihäireid või kui te võtate palju ravimeid, mis mõjutavad ajutegevust
- kui teie silmasisene rõhk on tõusnud, nimetakse glaukoomiks
- kui te olete eakas, kuna lorasepaami kasutamise korral on teil suurem tõenäosus tunda uimasust ja kukkuda.

Kui mõni ülalmainitud punktidest käib teie kohta, peate te enne lorasepaami kasutamist seda oma arsti või apteekriga arutama.

Muud ravimid ja lorasepaam

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui lorasepaami kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- mõnda teist rahustit või ärevusevastast ravimit;
- antidepressante;
- tugevaid valuvaigisteid, nagu tramadool, kodeiin, morfiin, metadoon;
- epilepsiaravimeid, nt naatriumvalproaat;
- allergivastaseid antihistamiinikume;
- meeleolu- või vaimsete häirete ravimeid, nagu kloorpromasiin, klosapiin, haloperidool, loksapiin;
- astma ravimeid, nagu teofülliin või aminofülliin;
- lihaskõõgasteid;
- podagra ravimit nimega probenetsiid;
- skopolamiini nimelist ravimit, mida võidakse kasutada soolestiku probleemide korral enne operatsiooni.
- disulfiraami, mida kasutatakse kroonilise alkoholismi korral
- metronidasooli, üks antibiootikum

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos lorasepaamiga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Lorasepaami kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkohol

Ärge jooge alkoholi lorasepaami kasutamise ajal.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Lorasepaami ei tohi raseduse ajal kasutada. Raseduse ajal kasutatuna võib lorasepaam kahjustada sündimata last. Kui te kasutate lorasepaami raseduse hilises järgus või sünnituse ajal, võib teie laps olla vähem aktiivne kui teised lapsed, tema lihased võivad olla lõdvdad, kehatemperatuur ja/või vererõhk madal, esineda võib hingamis- või söömisraskusi. Teie laps ei pruugi mõnda aega reageerida adekvaatselt külmale. Kui te võtate raseduse hilises järgus lorasepaami regulaarselt, võivad teie lapsel pärast sündi tekkida ärajätunähud.

Lorasepaam võib erituda rinnapiima. Seetõttu ei tohi seda rinnaga toitmise ajal võtta, välja arvatud juhul, kui eeldatav kasu kaalub üles võimaliku riski lapsele. Kui te kasutate lorasepaami imetamise ajal võivad teie lapsel tekkida sedatsioon ja raskused rinna imemisel. Sellisel juhul on soovitatav lapse jälgimine.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige lorasepaami kasutamise ajal autot, käsitsege masinaid või sooritage keskendumist nõudvaid tegevusi. Lorasepaam võib kuni 48 tunni jooksul peale ravimi manustamist muuta teid uniseks või põhjustada pearinglust ja mõjutada keskendumist. Need toimed võivad olla tugevamad, kui te ei ole öösel piisavalt maganud.

3. Kuidas lorasepaami kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab teile sobiliku annuse, sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite ja kui hästi te ravige talute. Järgige alati oma arsti juhiseid.

Kui te kasutate lorasepaami rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Bensodiasepiinide üleannustamise korral esineb tavaliselt teadvuse häireid alates unisusest kuni koomani. Mõõduka raskusega üleannustamise juhtudel esineb unisus, uimasus, segasus. Raskematel juhtudel, eriti juhul, kui samaaegselt on manustatud ka teisi kesknärvisüsteemi pärssivaid aineid või alkoholi, võivad esineda kõnehäired, koordinatsioonihäired, kehatemperatuuri langus, hingamise pärssumine, südametöö aeglustumine, kooma, surm.

Kui te unustate lorasepaami kasutada

Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate lorasepaami kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Ravi lorasepaamiga tuleb lõpetada annuseid järk-järgult vähendades. Teie arst ütleb teile, kuidas seda täpselt teha.

Kui te lõpetate lorasepaami kasutamise, võivad teil tekkida ärajätusümptomid, nagu peavalu, lihasvalu, ärevus, unehäired, pinge, depressioon, rahutus, pearinglus, iiveldus, kõhulahtisus, söögiisu kadumine, segasus, ärrituvus, erutatus, värinad, kõhu ja/või lihasvalu, südamerütmi muutused, lühimälu kaotus, kõrge palavik ja higistamine. Teie algne unehäire võib taastuda. Kui mõni neist sümptomitest ilmneb, ei kesta need tavaliselt kaua. Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest, küsige nõu oma arsti käest.

Ärge lõpetage lorasepaami kasutamist järsku. Ravi järsul lõpetamisel võivad teil tekkida rasked ärajätunähud, nagu reaalsustaju kadumine, elust eraldumise tunne, emotsioonitus. Mõnedel patsientidel on esinenud käte ja jalgade tuimust või kihelustunnet, oksendamist, tinnitus (helinat kõrvus), tõmbulsi, hallutsinatsioone (olematute asjade kuulmist või nägemist), krampe ja ülitundlikkust

puudutusele, helile või valgusele. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, küsige koheselt nõu oma arsti käest.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest, pöörduge koheselt oma arsti poole:

- Ootamatu ja raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskusi ja pearinglust
- Raske allergiline reaktsioon, millega kaasneb näo, huulte ja kõri turse
- Naha ja silmavalgete kollasus
- Hingamisraskused
- Enesevigastamise või enesetapumõtted
- Vaimse seisundi muutused, nt rahutus, ärrituvus, agressiivsus, hallutsinatsioonid, tavatu käitumine.

Lorasepaam võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid

Väga sage – ilmneb rohkem kui ühel kasutajal 10' st:

- Uimasus, unisus
- Väsimus

Sage – ilmneb 1...10 kasutajal 100' st:

- Segasus, meeleolu langus
- Vähenenud kontroll lihaste üle, pearinglus
- Lihasnõrkus, jõu kadumine
- Energiapuudus

Aeg-ajalt – ilmneb 1...10 kasutajal 1000' st:

- Iiveldus
- Suguhiha muutused, impotentsus, orgasmi saamise vähenemine

Esinemissagedus teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata):

- Punaste ja valgete vereliblede ning trombotsüütide vähesus, mille tulemuseks on seletamatud verevalumid ja veritsused, kahvatu nahk, nõrkus/hingeldamine ja/või sagedased infektsioonid.
- Allergilised nahareaktsioonid, nt punetus, lööve; juuste väljalangemine
- Madal naatriumitase veres, kontsentreeritud (väga tume) uriin
- Väga madal kehatemperatuur
- Lühimäluhäired
- Lihasspasmid, raskused suu avamisel, kalduvus keelt suust välja ajada, segane kõne ja tavatud muutused kehaasendis, keskendumisraskused, pearinglus, pöörlemistunne, peavalu, värinad, krambid, teadvusetus
- Ähmane nägemine, topeltnägemine
- Madal vererõhk
- Ärevus, erutuvus, agressioon, raev, unehäired, olematute asjade kuulmine ja nägemine – need võivad tõenäolisemalt ilmneda lastel ja eakatel
- Hingamissageduse vähenemine, hingeldamine, ajutine hingamisseisak, sh magades, astma ägenemine, kõnelemisraskused ja segane kõne
- Kõhukinnisus
- Maksafunktsiooni muutused
- Muutused veres

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.raviamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas lorasepaami säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.