

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tetrakosaktiid, 0,25mg/ml, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on tetrakosaktiid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne tetrakosaktiidi kasutamist
3. Kuidas tetrakosaktiidi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas tetrakosaktiidi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on tetrakosaktiid ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine tetrakosaktiid kuulub hüpofüüsi eessagara hormoonide ja nende analoogide hulka. Tetrakosaktiidi kasutatakse neerupealise puudulikkuse diagnostikaks.

2. Mida on vaja teada enne tetrakosaktiidi kasutamist

Tetrakosaktiidi ei tohi kasutada:

- kui olete tetrakosaktiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on mõni teine allergia
- kui teil on astma
- kui teil on mõni tõsine meeleolu- või vaimse tervise häire
- kui teil on käesolevalt mingi infektsioon
- kui teil on mingisugune hormonaalne haigus, sh Cushingi sündroom, Addisoni sündroom
- kui teil on mao- või peensoole haavand
- kui teil on mõni tõsine südamehaigus

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne tetrakosaktiidi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on kõrge vererõhk
- kui teil on trombemboolia
- kui teil on myasthenia gravis
- kui teil on osteoporoos
- kui teil on mingisugune põletikuline soolehaigus (nt. Haavandiline koliit, divertikuliit)
- kui teid on hiljuti vaktsineeritud
- kui teil on rakse maksahaigus (nt maksatsirroos)
- kui teie immuunsus on vähenenud
- kui te olete või arvate, et võiksite olla rase või toidate last rinnaga
- kui teil on herpes silmpex infektsioon silmas
- kui teil on mingisugune neerufunktsiooni häire

Muud ravimid ja tetrakosaktiid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui tetrakosaktiidi kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- vererõhuravimid (AKE-inhibiitorid nt. kaptopriil, beetablokaatorid nt. atenolool, angiotensiin-II retseptori agonistid nt. losartaan)
- diabeediravimid (nt. insuliin ja metformiin)
- kortikosteroidid
- krambivastased ravimid (nt. valproaat, fenütoiin, klonasepaam, nitrasepaam, fenobarbitaal, primidoon)
- rasestumisvastased ravimid

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos tetrakosaktiidiga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete ennast uimasena või teie nägemine on muutunud häguseks peale tetrakosaktiidi manustamist, siis ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

3. Kuidas tetrakosaktiidi kasutada

Tetrakosaktiidi kasutatakse haiglas, arsti järelevalve all.

Tetrakosaktiidi kasutatakse neerupealise puudulikkuse diagnostikaks. Selleks võetakse teilt kahel korral vereanalüüs: neist esimene enne tetrakosaktiidi manustamist ja teine 30 minutit peale tetrakosaktiidi manustamist. Nende vereanalüüsi tulemuste põhjal selgitatakse välja, kas teil esineb neerupealise puudulikkust.

Annustamine:

Täiskasvanutele, sh eakatele, manustatakse 0,25 mg tetrakosaktiidi.

Lastele manustatakse väiksem annus, sõltuvalt nende vanusest ja kehakaalust.

Kui te kasutate tetrakosaktiidi rohkem kui ette nähtud

Kuna tetrakosaktiidi kasutatakse haiglas ja seda manustatakse ühekordse annusena on vähetõenäoline, et keegi võiks manustada tetrakosaktiidi rohkem kui ette nähtud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tetrakosaktiid võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Infektsioonid ja infestatsioonid:

Abtsess, suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Leukotsütoos

Endokriinsüsteemi häired

Cushingi sündroom, sekundaarne adrenokortikaalne ja hüpopüüsi tundlikkuse langus, seda eriti stressi korral, nt. trauma-, kirurgilise operatsiooni või haiguse järgselt; ebaregulaarne menstruatsiooni tsükkel; hüperglükeemia, latentse diabeedi avaldumine; hirsutism.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Hüpokaleemia, kaltsiumi defitsiit, naatriumi taseme tõus organismis, vedelikku kogunemine organismis, suurenenud söögiisu.

Psühhiaatrilised häired

Psüühikahäire

Närvisüsteemi häired

Krambid, healoomuline intrakraniaalse rõhu tõuskoos papillödeemiga; vertiigo; peavalu

Silma kahjustused

Intraokulaarse rõhu tõus, glaukoom, subkapsulaarne katarakt, eksoftalm.

Südame häired

Kongestiivne südame puudulikkus.

Vaskulaarsed häired

Nekrotiseeriv vaskuliit, trombemboolia, hüpertensioon.

Seedetrakti häired

Pankreatiit, peptiline haavand, haavandiline ösofagiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Naha atroofia, petehhiad ja ekhümoosid, erüteem, hüperhidroos, akne ja naha hüperpigmentatsioon

Lihaskoe ja sidekoe kahjustused

Reie- ja õlavarreluu pea aseptiline nekroos, spinaalne kompressioonmurd, lihasatroofia, müopaatia, osteoporoos, lihaskoe nõrkus, pikkade luude patoloogiline murd, kõõluse rebend.

Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid

Allergilised reaktsioonid, kasvu aeglustumine, kaalutõus, aeglustunud haavade paranemine.

Uuringud

Vähenenud reaktsioon nahatestidele, negatiivne lämmastiku tasakaal.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas tetrakosaktiidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2016.