

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rifapentiin, 150 mg, tablett

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on rifapentiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne rifapentiini võtmist
3. Kuidas rifapentiini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas rifapentiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on rifapentiin ja milleks seda kasutatakse

Rifapentiin on antibiootikum. See omab toimet tuberkuloosi tekitaja *Mycobacterium tuberculosis*'e vastu. Rifapentiin on näidustatud latentse tuberkuloosi profülaktikaks koos isoniasiidiga.

2. Mida on vaja teada enne rifapentiini võtmist

Rifapentiini ei tohi kasutada:

- patsient, kes on rifapentiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
- aktiivse tuberkuloosiga patsient, kelle puhul varasem ravi rifampitsiini või isoniasiidiga ei toiminud (esines ravimiresistentsus) või kes on puutunud kokku tuberkuloosi põdeva inimesega (ja saanud nakkust inimeselt), kelle haigus ei allu ravile rifampitsiini või isoniasiidiga.

Rifapentiini tuleb kasutada alati kombinatsioonis teiste tuberkuloosivastaste ravimitega. Rifapentiini ei tohi kasutada aktiivse või latentse tuberkuloosi raviks monopreparaadina.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne rifapentiini võtmist pidage nõu oma arstiga:

- kui teil o aktiivne tuberkuloos.
- kui te teate, et teil on teatud ravimite suhtes resistentne tuberkuloos.
- kui teil on HIV-nakkus või te saate HIV-nakkuse vastast ravi.
- kui teil on porfüüria.
- kui te olete rase või plaanite rasestuda.
- imetate või kavatsete imetada.

Lapsed ja noorukid

Rifapentiini võib kasutada üle 2-aastaste latentse tuberkuloosiga laste raviks.

Kuid rifapentiini ohutus ja tõhusus alla 12-aastaste aktiivset tuberkuloosi põdevate laste ravis ei ole kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja rifapentiin

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui rifapentiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- HIV-vastased ravimid.
- suukaudsed rasestumisvastased preparaadid.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt, kas seda tohib võtta koos rifapentiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rifapentiini võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravimit tuleb võtta koos toiduga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rifapentiini toime raseda naise veel sündimata lapsele ei ole teada. Seetõttu ei tohi rifapentiini kasutada raseduse ajal muul juhul, kui äärmisel vajadusel.

Ei ole teada, kas rifapentiin eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi rifapentiini kasutamise ajal imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et rifapentiin avaldaks toimet auto juhtimise ja masinatega töötamise võimele. Kui teil esinevad ravi ajal kõrvaltoimed, mis kahjustavad teie auto juhtimise või masinatega töötamise võimet, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega seni, kuni see kõrvaltoime on möödunud.

3. Kuidas rifapentiini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Rifapentiini manustatakse suukaudselt. Võtke rifapentiini koos toiduga. Kui te ei suuda tablette tervena neelata, võite need purustada ja segada väikse koguse poolpehme toidu sisse. Võtke terve rifapentiiniga segatud toidukogus kohe sisse.

Ravimi annus ja mustamisskeem määratakse igale patsiendile individuaalselt sõltuvalt tema kehakaalust ja tervislikust seisundist ja samaaegselt kasutatavatest teistest ravimitest.

Kui te võtate rifapentiini rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate rifapentiini võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate rifapentiini võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Tegemist on antibiootikumiga. Antibiootikumravi korral tuleb alati väga täpselt järgida määratud raviskeemi ja teha ravikuur lõpuni, isegi siis kui teie haigus on hakanud taanduma ja teile tundub, et te ei vajagi ravimit enam. Antibiootikum-ravi enneaegne iseseisev lõpetamine soodustab ravimresistentsuse kujunemist (haigustekitaja muutub ravimatuks).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Rifapentiin võib põhjustada järgmisi ohtlikke kõrvaltoimeid. Kui teil tekib midagi järelnimetatust, siis pöörduge kohe arsti poole:

- Maksafunktsiooni kahjustus. Teie arst võib teilt enne ravi alustamist ja ravi ajal võtta vereproove, et kontrollida maksafunktsiooni. Katkestage rifapentiini võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest maksaprobleemide sümptomitest:
 - iiveldus ja oksendamine
 - kõhuvalu
 - söögiisu kadumine
 - väsimus, naha või silmavalgete kollaseks värvumine
 - tume uriin
- Allergilise reaktsioonid. Sümptomid võivad olla:
 - madal vererõhk (hüpotensioon)
 - hingamisraskused
 - lööve
 - silmade punetus (konjunktiviit)
 - kähisev köha
 - madal vereliistakute arv
- Gripisarnane reaktsioon, sümptomid võivad olla:
 - nõrkus
 - väsimus
 - lihasvalu
 - iiveldus ja oksendamine
 - peavalu
 - palavik
 - külmavärinad
 - valuhood
 - lööve
 - sügelus
 - higistamine
 - peapööritus
 - õhupuudus
 - valu rinnus
 - köha
 - minestamine
 - kiire südamesagedus
- Naha, suu ja kehavedelike värvuse muutus. Rifapentiin võib muuta teie naha, hammaste, keele, uriini, rooja, sülje, röga, higi ja rinnapiima punakasoranžiks. Kontaktläätsed ja hambaklambrid võivad püsivalt värvust muuta.

- Kõhulahtisus. Antibiootikumide, sealhulgas rifapentiini võtmise ajal või selle järel võib hakata soolestikus vohama *Clostridium difficile* ning põhjustada soole infektsiooni, mille raskusaste võib varieeruda vähesest kergest kõhulahtisusest kuni väga raske ja verise, isegi surmaga lõppeda võiva kõhulahtisuseni. Teavitage arsti, kui teil tekib rifapentiini võtmise ajal või järel kõhulahtisus. Teie arst peab teid sel juhul väga hoolikalt jälgima ja vajadusel ravi rifapentiiniga katkestama.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas rifapentiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoidke seda ravimit toatemperatuuril (20–25 °C juures), kuivas ja soojusallikatest eemal.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsi oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.