

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tetadif, mitte vähem kui 4 IU/0,5ml + 40 IU/0,5ml, süstesuspensioon
Adsorbeeritud difteeria ja teetanuse vaktsiin

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Tetadif ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Tetadifi kasutamist
3. Kuidas Tetadifi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Tetadifi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on Tetadif ja milleks seda kasutatakse

Tetadif on vaktsiin. Vaktsiini kasutatakse kaitseks nakkushaiguste eest.

Tetadif on näidustatud difteeria ja teetanuse vastaseks vaktsineerimiseks lastel alates 7-ndast eluaastast ja täiskasvanutel.

Pärast Tetadifi süstimist hakkab organism ise tootma kaitset (antikehasid) bakterite vastu, mis põhjustavad neid haigusi.

Tetadifi manustamisel tuleb lähtuda kohalikest kehtivatest immuniseerimisjuhistest.

2. Mida on vaja teada enne Tetadifi mist

Ärge kasutage Tetadifi patsiendil:

- kes on Tetadifi toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kellel on neuroloogiline probleem, mis tekkis pärast eelmist vaktsineerimist.
- kellel on palavik, äge haigus või kroonilise haiguse ägenemine, sellisel juhul tuleb vaktsineerimine edasi lükata.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tetadifi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teie immuunsüsteem on nõrk kortikosteroidide või tsütotoksiliste ravimite, kiiritusravi või muude ravimite manustamise tõttu.
- kui te olete allergiline vaktsiini koostisosade suhtes või kui teil tekkis ebanormaalne reaktsioon vaktsiini varasemal manustamisel.
- kui te olete saanud difteeria või teetanuse vaktsiini viimase viie aasta jooksul.
- kui teil esines Guillain-Barre sündroom (ebanormaalne tundlikkus, paralüüs) või brahhiaalne neuriit (paralüüs, käsivarde ja õlga kiirgav valu) pärast esmast teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini saamist

(teetanuse vastane vaktsiin). Sel juhul tuleb teie arsti poolt hinnata edasise teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini saamise otsust.

Lapsed ja noorukid

See vaktsiin on näidustatud kasutamiseks alates 7-ndast eluaastast.

Muud ravimid ja Tetadif

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Tetadifi võib manustada samaaegselt selliste vaktsiinidega nagu poliomüeliidi, gripi, B hepatiidi, leetrite-mumpsipunetiste ja BCG vaktsiin.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos Tetadifiga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Vaktsiini võib kasutada raseduse ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et Tetadif mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas Tetadifi kasutada

Tetadifi üksikannus on 0.5 ml süstituna lihasesse.

Tetadifi tuleb enne manustamist loksutada, et muuta suspensioon homogeenseks.

Iga vaktsineeritava puhul tuleb kasutada uut steriilset nõela.

Vaktsiin tuleb manustada koheselt pärast süstla täitmist.

Kui teile süstitakse Tetadifi rohkem kui ette nähtud

Tetadifi manustab meditsiinitöötaja. Seetõttu on üleannustamine vähetõenäoline. Üleannustamise juhtudest pole teatatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tetadif võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

Punetust, valulikkust, turset või nahaaluse sõlmekese tekkimist süstekohale. Enamasti mööduvad need kõrvaltoimed kiiresti ja ravita, harvemal juhul võivad püsida kauem. Süsteemse kõrvaltoimena on teadaud palaviku esinemisest.

Võimalikud kõrvaltoimed (sh need, mida ei ole otseselt teatatud selle vaktsiiniga, vaid teiste vaktsiinidega, mis sisaldavad ühte või enamat selle vaktsiini antigeenset koostisosat):

- Pärast teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini manustamist on teatatud Guillain- Barre sündroomist (ebanormaalne tundlikkus, paralüüs) ja brahhiaalsest neuriidist (paralüüs, käsivarde ja õlga kiirgav valu).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Tetadifi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Vaktsiini tuleb säilitada pimedas kohas temperatuuril - +2 kuni+8 C.
Tetadif vaktsiini ei tohi külmutada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Abiained: Tetadif sisaldab alumiiniumhüdrosiidi, mitte rohkem kui 1,25 mg (adsorbent).
Tetadifi mitmeannuselised viaalid sisaldavad tiomersaali 0,037-0,050 mg/0,5 ml (säilitusaine).
Tetadifi üheannuselised viaalid tiomersaali ei sisalda.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.