

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prednisoloon, 50 mg, tahke suukaudne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on prednisoloon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne prednisolooni võtmist
3. Kuidas prednisolooni võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas prednisolooni säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on prednisoloon ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine prednisoloon on glükokortikosteroid. See on hormoon, mida toodetakse neerupealistes. Sellel on põletikuvastane, immunsüsteemi pärssiv ja allergia vastane toime. Prednisolooni kasutatakse pahaloomuliste kasvujate, aneemiatega, purpura ja muude hemorraagiliste seisundite korral.

2. Mida on vaja teada enne prednisolooni võtmist

Ärge võtke prednisolooni:

- kui olete prednisolooni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on süsteemne infektsioon (sh leetrid, tuulerõuged, vöötohatis, seeninfektsioon)
- kui teil on herpesinfektsioon silmas
- kui teid on hiljuti vaktsineeritud elusviiruseid sisaldavate vaktsiinidega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne prednisolooni võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- tõsiste psüühikahäirete korral (eriti kui anamneesis on steroidraviga seotud depressioon või psühhooos)
- kui teil on epilepsia
- kui teil või kellelgi teie perekonnas on diabeet. Prednisoloon võib tõsta vere suhkrusisaldust.
- kui teil on kõrge vererõhk
- kui teil on maksahaigus
- kui teil on neeruhaigus
- kui teil on südamehaigus, sh südamepuudulikkus ja müokardiinfarkt
- kui teil on osteoporoos (luuhõrenemine)
- kui teil on lihahaigus, sh *myasthenia gravis*
- kui teil on esinenud verehüübeid, nt süvaveeni tromboos või trombemboolia

- kui teil või kellelgi teie perekonnas on glaukoom või kui teil on korioretinopaatia või herpes *simplex* silmas
- kui teil on olnud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandeid
- kui te võite olla nakatunud leetritesse, tuulerõugetesse, vöötohatisse
- kui teil on tuberkuloos
- kui teid on hiljuti vaksineeritud või on teil vaksineerimine plaanis
- kui teil on olnud kilpnäärmehaigus
- kui teil on äge nakkushaigus
- kui teil on herpesinfektsioon;
- kui teil on varem esinenud allergilisi reaktsioone mis tahes ravimitele;
- kui teil on Cushingi tõbi
- kui teil on erütematoosne luupus (SLE, autoimmuunhaigus)
- kui te olete eakas. Eakatel on risk kõrvaltoimete tekkeks suurem, eriti pikaajalise ravi korral.

Inimesed, kes kasutavad immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid, on infektsioonidele vastuvõtlikumad kui terved inimesed. Näiteks tuulerõuged, leetrid ja vöötohatis võivad kortikosteroidide (sh prednisolooni) saavalte mitteimmuunsetel lastel või täiskasvanutel kulgeda raskemini või lõppeda isegi surmaga.

Kui patsienti, kellel on väljendunud immuunpuudulikkus ja kes pole tuulerõugetele immuunne, ravitakse prednisolooniga, tuleb teda vaksineerida tuulerõugete vastu. Teisi vaksineerimisi ei tohi kortikosteroidravi saavalte patsientidel ette võtta, eriti kui manustatavad annused on suured, kuna esineb risk neuroloogiliste komplikatsioonide tekkimiseks ning kuna vastus antikehade näol on puudulik.

Lapsed ja noorukid

Üldiselt tuleb prednisolooni annust vähendada proportsionaalselt lapse vanuse või kehakaaluga, kuid annuse kohandamisel tuleb lähtuda ka haiguse tõsidusest ja kliinilisest vastusest.

Kasutada tuleb väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Muud ravimid ja prednisoloon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui prednisolooni kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid. Prednisolooni kombineerimine teiste ravimitega, mis võivad põhjustada seedetrakti haavandite teket (nt mittesteroidsed põletikuvastased ravimid), suurendab seedetrakti tüsistuste tekkeriski.
- Diabeedi ravimid, nt insuliin. Prednisoloonravi ajal võib diabeediga patsientidel olla suurenenud vajadus insuliini või suukaudsete antidiabeetiliste ravimite järele.
- Verd vedeldavad ravimid, nt varfariin.
- Epilepsia ravimid, nt karbamasepiin, fenütoin
- Barbituraadid. Barbituraadid võivad vähendada prednisolooni toimet.
- Kõrgevererõhutõve raviks kasutavad ravimid, nt furosemiid, tiasiidid. Prednisolooni kasutamine samaaegselt tiasiiddiureetikumidega suurendab glükoosi talumatuse tekkeriski.
- Ravimid, mis sisaldavad östrogeeni nt hormonaalsed suukaudsed kontratseptiivid
- Infektsiooni vastased ravimid, sh seentevastased nt ketokonasool, viirusevastased ravimid nt ritonavir (kasutatakse HIV korral) ja antibakteriaalsed ravimid nt rifampitsiin, erütromütsiin.
- Astma ravimid nt salbutamool, salmeterool, teofülliin.
- Tsüklosporiin (kasutatakse immuunsuppressiooniks). Prednisolooni ja tsüklosporiini samaaegsel kasutamisel on esinenud krampe.
- Kasvajate või psoriaasi raviks kasutatavad ravimid nt metotreksaat
- Mifeproston (kasutatakse raseduse katkestamiseks)

Prednisolooni võtmise ajal ei tehta allergeenide määramiseks mõeldud nahateste.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos prednisolooniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Prednisolooni võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Võimaliku maoärrituse vähendamiseks on soovitatav ravimit võtta koos toiduga või kohe pärast sööki.

Alkohol

Ärge jooge selle ravimi võtmise ajal alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

Prednisoloon läbib platsentaarbarjääri. Prednisolooni kasutamist ei ole seostatud väärandite tekkega lootel, kuid esineb suurem risk (välja arvatud lühiajalisel kasutamisel) loote emakasisese kasvupeetuse, platsentaarpuudulikkuse, enneaegsuse ja neerupealise koore funktsiooni pärssumise tekkeks.

Prednisoloon eritub rinnapiima. Kui ema kasutab imetamise ajal prednisolooni vähem kui 40 mg ööpäevas, ei ole vastsündinul tõenäoliselt kõrvaltoimeid oodata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et prednisoloon mõjutaks teie võimet juhtida autot või töötada masinatega.

3. Kuidas prednisolooni võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi täpsed annused sõltuvad teie vanusest ja teie haigusest. Teie arst määrab teile vajalikud ravimiannused.

Kui te võtate prednisolooni üks kord ööpäevas, on soovitatav seda võtta hommikuti.

Kui te võtate prednisolooni rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Ühekordne äge üleannustamine ei põhjusta olulisi terviseprobleeme. Pikemaajaline üleannustamine võib põhjustada rasvladestuse teket kõhu ja näo piirkonnas, kiirenenud karvakasvu, aknelöövet, vererõhu tõusu, jäsemete turset ja valu või lihasnõrkust.

Üleannustamise kahtluse korral katkestage koheselt prednisolooni kasutamine, üleannustamise ravi on sümptomaatiline.

Kui te unustate prednisolooni võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate prednisolooni võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui te olete prednisolooni võtnud pika aja jooksul, siis ei tohi arsti nõusolekuta ravimi võtmist järsku katkestada. Ravi tuleb lõpetada annuse järk-järgulise vähendamise teel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest:

- Väga tõsine kõhuvalu. See võib olla kõhunäärme põletiku sümptom.
- Psühhiaatriline häire, nt
 - o depressioon, sh suitsiidimõtted
 - o eufooriline meeleolu, väga muutlik meeleolu
 - o ärevus, unehäired, segasus, mäluhäired
 - o hallutsinatsioonid
 - o füüsiline sõltuvus sellest ravimist

Prednisoloon võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:

Südame häired

Kõrge vererõhk, südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, ebaregulaarne südame rütm.

Vaskulaarsed häired

Tromboos (hüübed veresoontes), embolism (veresoonega edasi kanduvad hüübed veresoontes).

Seedetrakti häired

Söögiisu suurenemine, seedehäired, iiveldus, kaalutõus, seedetrakti haavandid, sh seedetrakti verejooks, kõhulahtisus, ösofageaalne kandidiaas, kõhunäärme põletik.

Lihaskoe ja sidekoe kahjustused

Luuhõrenemine, luumurrud, lihasnõrkus, lihasvalu, lihasmassi kadu.

Närvisüsteemi häired

Uimasus, peavalu, unehäired, epilepsia süvenemine, koljusisese rõhu tõus (valu silmade taga)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Haavade paranemise aeglustumine, naha atroofia (naha õhenemine), naha kuivus, naha sügelemine, hirsutism (tavapärasest intensiivsem naha karvakasv), nahalööbed, akne, hematoomide teke tavapärasest kergemini, venitusele allutatud kohtadel te striiad (lillakaspunased lainelised venitusjooned), kapillaaride laienemine, marmornahk (nahk on punase-sinise laiguline).

Silma kahjustused

Glaukoom, katarakt, silmamuna ettevõlvumine (eksoftalm), haavandiline keratiit, silmainfektsioon.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Vähenenud kaaliumitase veres, suurenenud naatriumi tase veres, suurenenud glükoositase veres, vedelikupeetus, suurenenud söögiisu.

Neerude ja kuseteede häired

Tursed

Endokriinsüsteemi häired

Glükokortikosteroidide (steroidhormoonide) suurte kontsentratsioonide puhul võib tekkida Cushingi sündroom, mida iseloomustavad kehatüve rasvumine, näo muutumine ümaraks, rasvapadjad turjal, nõrkus, väsimus, seljavalu, peavalu, suurenenud janu, sagenenud urineerimine, impotentsus, muutused vaimses seisundis ning lihasatroofia (lihasmassi kadu), naha muutused.

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus (allergilised reaktsioonid).

Vere ja lümfisüsteemi häired

Tromboos (hüübed veresoontes), leukotsütoos (leukotsüütide arvu suurenemine veres)

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Menstruatsiooni muutumine ebaregulaarseks, erektsioonihäired

Psühhiaatrilised häired

Unetus, ärevus, mäluhäired, eufooriline meeleolu, depressioon (sh enesetapumõtted), muutlik meeleolu, hallutsinatsioonid.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Üldine halb enesetunne, ebanormaalne kehatemperatuuri tõus, palavik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas prednisolooni säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.