

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Droperidool, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on droperidool ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne droperidooli kasutamist
3. Kuidas droperidooli kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas droperidooli säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on droperidool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine droperidool on butürofenooni derivaatide hulka kuuluv neuroleptikum.

Droperidoolil on dopamiini retseptoreid blokeeriv toime ja nõrk α 1-adrenolüütiline toime.

Droperidoolil on iiveldusvastane toime. Droperidooli kasutatakse operatsiooni järgse ja opioidide kasutamisest tingitud iivelduse ja oksendamise korral ja selle ennetamiseks.

2. Mida on vaja teada enne droperidooli kasutamist

Droperidooli ei tohi kasutada, kui patsiendil on:

- droperidooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergia
- allergia butürofenooni derivaatide suhtes (nt haloperidool, triperidool, benperidool, melperoon, domperidoon)
- ebanormaalne südamerütm EKG-s
- madal magneesiumi ja kaaliumi tase veres
- südame löögisagedus alla 55 korra minutis või kui patsient kasutab samaaegselt ravimeid, mis langetavad südame löögisagedust
- neerupealise kasvaja (feokromotsütoom)
- Parkinsoni tõbi
- raske depressioon
- kooma.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on droperidooli kasutamisel vajalik, kui patsiendil on:

- anamneesis epilepsia
- anamneesis südamehaigus
- perekonnas esinenud äkksurma

- neeruhaigus (eriti pikaajalist dialüüsi saavad patsiendid)
- kopsuhaigus või hingamisraskused
- pikaajaliselt kestnud iiveldus või kõhulahtisus
- suurenenud tromboosioht (sh perekonnas esinev suurenenud tromboosioht), kuna dromperidool suurendab riski verehüüvete tekkeks veelgi.
- anamneesis alkoholism

kui patsient kasutab:

- insuliini
- samal ajal kaaliumi säästvat diureetikumi (nt furosemiid)
- kõhulahtisteid
- glükokortikosteroide (teatud hormoon)

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel tuleb määrata annused vastavalt kehakaalule. Droperidooli ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 2 eluaasta.

Muud ravimid ja droperidool

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui dromperidooli kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

Prokaiinamiid, amiodaroon, sotalool, kinidiin, disopüramiid (südame ravimid).
 Erütromütsiin, klaritromütsiin, sparfloksatsiin (antibiootikumid).
 Astemisool, terfenadiin (allergiavastased ravimid).
 Kloorpromasiin, haloperidool, pimosiid, tioridasiin (skisofreeniavastased ravimid).
 Klorokviin, halofantriin (malaria vastased ravimid).
 Tsisapriid (seedetrakti haiguse ravim).
 Pentamidiin (infektsioonivastane ravim).
 Domperidoon (iivelduse ja oksendamise vastane ravim).
 Metadoon (valuravim).

Droperidooliga samaaegselt ei tohi kasutada metoklopramiidi ja neuroleptikume, sest nende ravimite kooskasutamisel suureneb risk liikumisraskuste tekkimiseks.

Droperidool võib võimendada uinutite (nt barbituraadid ja bensodiasepiinid), morfiini sarnaste ravimite, samuti vererõhku langetavate ravimite ja mitmete teiste ravimite nagu teatud seentevastased ravimid, viirusvastased ravimid, antibiootikumid, toimet.

Samuti võivad mõned teised ravimid võimendada droperidooli toimet, nt tsimetidiin (kasutatakse maohaavandute korral), tiklopidiin (kasutatakse vere vedeldamiseks), mibefradiil.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos droperidooliga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Droperidooli kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkohol

Alkoholi ei tohi juua 24 tundi enne ja peale selle ravimi manustamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või arvate end olevat rase, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kui te toidate last rinnaga, siis ei tohi te saada rohkem kui ainult ühe annuse seda ravimit. Rinnaga toitmist võite jätkata pärast operatsiooni.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega 24 tunni jooksul peale seda, kui teile on manustatud seda ravimit.

3. Kuidas droperidooli kasutada

Parenteraalselt manustatavat droperidooli manustatakse haiglatingimustes tervishoiutöötaja poolt. Droperidooli manustatakse veenisisesse süstena.

Ravimi täpse annuse üle otsustab arst sõltuvalt patsiendi tervislikust seisundist, vanusest ja kehakaalust.

Tavapärane annus täiskasvanutele on 0,625 kuni 1,25 mg.

Eakatele patsientidele (vanuses üle 65 aasta) ja neerupuudulikkusega patsientidele soovitatakse annust 0,625 mg.

Lastele vanuses 2-11 eluaastat ja noorukitele vanuses 12-18 eluaastat määratakse annus sõltuvalt nende kehakaalust: 10 kuni 50 mikrogrammi/kg, kuid mitte rohkem kui 1,25 mg.

Droperidooli ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 2 aasta.

Kui te kasutate droperidooli rohkem kui ette nähtud

Droperidooli kasutatakse haiglatingimustes ja manustatakse tervishoiutöötaja poolt, seetõttu on üleannustamine vähe tõenäoline.

Kui teie või keegi teine on siiski manustanud liiga suure annuse seda ravimit, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Patsienti peab teavitama, et kui droperidooli manustamise järgselt tekib kehatermaturu tõus, lihasjäikus, värisemine, näo ja kõri turse või valu rinnus, siis tuleb koheselt pöörduda arsti poole.

Droperidool võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid (kõrvaltoimed on jaotatud esinemissageduse alusel):

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed:

Unisus

Vererõhu langus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

Rahutus

Silmade tahtele allumatud liigutused

Kiirenenud südame löögisagedus

Pearinglus

Harva esinevad kõrvaltoimed:

Tõsised allergilised reaktsioonid

Segasus

Rahutus

Ebaregulaarne südame löögisagedus

Nahalööve

Maliigne neuroleptiline sündroom, mille sümptomite hulka kuuluvad palavik, higistamine, suurenenud sülje produktsioon, lihasjäikus, värisemine.

Väga harv esinevad kõrvaltoimed:

Vereloome häire (sagedamini seotud erütrotsüütide või trombotsüütidega)

Meeleolu muutused, sh kurvameelsus, depressioon, rahutus, ärrituvus

Tahtele allumatud lihastõmbused

Krambid ja värisemine

Südame seiskumine

Torsades de pointes (eluohulik südame rütmihäire)

Pikenenud QT intervall EKG-s (testud tüüpi südame rütmihäire)

Äkksurm

Üksikutel juhtudel esinenud kõrvaltoimed:

Antidiureetilise hormooni liig organismis (põhjustab vedeliku liigset kogunemist ja liiga madalat naatriumi kontsentratsiooni organismis)

Hallutsinatsioonid

Epileptilised krambid

Parkinsoni tõbi

Psühhomotoorne hüperaktiivsus

Minestamine

Hingamisraskused

Trombide (verehüüvete) teke veenides, sagedamini jalgades (sümptomite hulka kuuluvad turse, valu, punetus kehapiirkonnas, kus trombon tekkinud), misjärel võib tromb liikuda edasi kopsu põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Patsient peab teadma, et kui temaga midagi sellist juhtub, siis tuleb koheselt pöörduda arsti poole.

Kooma

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas droperidooli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud veebruar 2017.