

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Naatriumkloriid, 5%, silmasalv

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on naatriumkloriidi silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne naatriumkloriidi silmasalvi kasutamist
3. naatriumkloriidi silmasalv kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas naatriumkloriidi silmasalvi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on naatriumkloriidi silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Naatriumkloriidi silmasalvi kasutatakse teatud sarvkesta haigusseisundite korral (sh bulloosne ehk põiendiline keratopaatia, sarvkestaturse, sarvkestamembraanide muutused, pärilikud sarvkesta düstroofiad, sarvkesta muud moonutised).

Hüpertooniline (5%) naatriumkloriidi salv aitab turses sarvkestast vedelikku välja tõmmata.

2. Mida on vaja teada enne naatriumkloriidi silmasalvi kasutamist

Naatriumkloriidi silmasalvi ei tohi kasutada kui

- olete allergiline ravimi toimeaine või abiainetete suhtes (vt pakendilt).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Lapsed ja noorukid

Ei ole piisavalt tõendeid ravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta selles vanusegrupis.

Eakad

Ei ole piisavalt tõendeid ravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta selles vanusegrupis.

Muud ravimid ja naatriumkloriidi silmasalv

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid sh silmaravimeid.

Kui kasutate teisi silma manustatavaid ravimeid, manustage need 5 minutilise vahega. Silmasalvid tuleks manustada viimasena,

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Naatriumkloriidi silmasalvi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Ravimi paikne manustamine silma ei tohiks põhjustada kahjulikku toimet lootele.

Imetamine

Naatriumkloriidi silmasalvi kasutamise kohta imetamise ajal andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Ravimi paikne manustamine silma ei tohiks põhjustada ravimi imendumist rinnapiima ega põhjustada imikule kahjulikku toimet.

Fertiilsus

Ravimi toimet fertiilsusele ei ole uuritud. Ravimi paikne manustamine silma ei tohiks põhjustada kahjulikku toimet viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi kasutamine võib põhjustada nägemise hägustumist. Autojuhtimist ja masinatega töötamist tuleks vältida senikaua, kuni nägemine taastub.

3. Kuidas naatriumkloriidi silmasalvi kasutada

kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Täiskasvanud

Väike kogus ravimit (umbes poole cm riba) iga 3 kuni 4 tunni tagant, või nii nagu arst teile on selgitanud.

Manustamisviis

Avage tuub. Ärge puudutage salvituubi otsikuga mingeid pindu. Tõmmake alumist silmalaugu allapoole. Hoidke tuubi ava silmale lähedal, kuid mitte silma vastas. Pigistage väike kogus (umbes poole cm riba) salvi silma alumise lau ja silmamuna vahele. Sulgege silmad paariks minutiks ja pilgutage mõned korrad, et salv jaotuks ühtlaselt üle silma pinna.

Kui te manustate naatriumkloriidi silmasalvi rohkem, kui ette nähtud

Kui te manustate ravimit liiga suures koguses silma, on oodatavad kõrvaltoimed samad, mis on loetletud lõigus 4.

Tulenevalt ravimi koostisest, ei ole selle allaneelamise korral oodata kahjulikke kõrvaltoimeid.

Kui te unustate naatriumkloriidi silmasalvi kasutada

Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate naatriumkloriidi silmasalvi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Naatriumkloriidi silmasalv võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Silma kahjustused

- valu või ärritustunne silmas

Kui teil tekib valu silmades, muutused nägemises, kauakestev silmade punetus või ärritustunne, sümptomite püsimine kauem kui 3 päeva või nende halvenemine, pidage nõu oma arstiga.

Pidage nõu oma arstiga, kui te vigastate oma silma, kui teil tekib infektsioon silmades või kui te vajate operatsiooni silmade piirkonnas. Vajadusel vahetatakse teil ravi.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas naatriumkloriidi silmasalvi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2020.