

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Retinool + dekspantenool, 20TÜ+20mg/g, silmasalv

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on retinool+dekspantenool silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne retinool+dekspantenool silmasalvi kasutamist
3. Kuidas retinool+dekspantenool silmasalvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas retinool+dekspantenool silmasalvi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on retinool + dekspantenool silmasalv ja milleks seda kasutatakse

See ravim sisaldab kahte toimeainet:

Toimeaine retinool on vitamiin A, mis soodustab rakkude uuenemist, epiteeli kasvu ja reetina valgustundlikkust.

Toimeaine dekspantenool on pantoteenhappe bioloogiliselt aktiivne derivaat. Pantoteenhape kuulub B-vitamiinide gruppi ja on vajalik epiteelrakkude moodustumiseks.

Retinooli ja pantoteenhapet sisaldav silmasalv on näidustatud konjunktivi haigusseisundite, keratiidi e sarvkestapõletiku ja sarvkesta muude haigusseisundite ning silmalau haigusseisundite raviks.

2. Mida on vaja teada enne retinool + dekspantenool silmasalvi kasutamist

Ärge kasutage retinool + dekspantenool silmasalvi:

- kui olete retinooli, dekspantenooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne retinool + dekspantenool silmasalvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on mädane konjunktiviit. Sel juhul vajate raviks ka antibiootikumi, et hävitada haigustekitaja. Ainult retinoolist ja dekspantenoolist bakteriaalse põletiku raviks ei piisa.
- kui te kannate kontaktläätsesid. Ravi ajal ei soovitata kontaktläätsesid kanda.

Muud ravimid ja retinool + dekspantenool silmasalv

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Retinool+dekspantenool silmasalvi kasutatakse ainult silmas, mistõttu ei imendu see süsteemselt organismi ega oma koostoimeid teiste ravimitega.

Kui kasutate samaaegselt nii silmatilkasid kui salvi, siis viimasena kasutage salvi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Retinool+dekspantenool silmasalvi toimeained on vitamiinid. Retinool+dekspantenool silmasalv ei oma kahjulikku toimet ei raseda naise sündimata lapsele ega imetava ema rinnapiima saavale lapsele. Ravimit võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nagu kõik silma manustatavad ravimid võib ka retinool+dekspantenool silmasalv põhjustada hägusat nägemist. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega seni, kuni teie nägemine on taastunud.

3. Kuidas retinool+dekspantenool silmasalvi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Seda ravimit manustatakse silma.

Enne salvi manustamist peske käed ja seiske peegli ette.

Manustamine:

1. Avage tuub. Ärge puudutage salvituubi otsikuga mingeid pindu.

2. Tõmmake alumist silmalaua allapoole, et moodustuks kotike.

Asetage salvituubi otsik kotikese kohale ja vaadake üles.

3. Ärge puudutage salvituubi otsikuga ripsmeid ega silma.

Manustage kotikesse umbes 1 cm salvi.

4. Sulgege silmad ja pilgutage mõned korrad, et salv jaotuks ühtlaselt üle silma pinna. Sulgege tuub.

Kui kasutate samaaegselt nii silmatilkasid kui salvi, siis viimasena kasutage salvi.

Kui te kasutate retinool+dekspantenool silmasalvi rohkem kui ette nähtud

Ei ole teatatud, et selle ravimi üleannustamine oleks kõrvaltoimeid põhjustanud.

Kui te unustate retinool+dekspantenool silmasalvi kasutada

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate retinool+dekspantenool silmasalvi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Silma kahjustused:

Sage ($\geq 1/100$ kuni $< 1/10$): mööduv kipitus ja hägune nägemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas retinool+dekspantenool silmasalvi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2019.