

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

### Pakendi infoleht: teave kasutajale

#### Etambutool, 400 mg, tablett

### Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on etambutool ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne etambutooli võtmist
3. Kuidas etambutooli võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas etambutooli säilitada
6. Muu teave

#### 1. Mis ravim on etambutool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine etambutool kuulub tuberkuloosivastaste ravimite hulka. Etambutooli kasutatakse multiresistentse tuberkuloosi raviks.

#### 2. Mida on vaja teada enne etambutooli võtmist

##### Ärge võtke etambutooli:

- kui te olete etambutooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
- kui teil on probleeme nägemisega. Enne ravi alustamist etambutooliga tuleb kontrollida patsiendi nägemist. Kui patsiendi nägemine halveneb ravi ajal etambutooliga, tuleb ravi koheselt katkestada ja pöörduda arsti poole. Enamikul raviaegse nägemise halvenemise juhtudest taastub nägemine pärast ravi lõpetamist mõne nädala või kuu jooksul. Harvadel juhtudel võib nägemise taastumine võtta kauem või võib nägemiskahjutus olla püsiv.

#### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

##### Enne etambutooli võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on probleeme neerudega. Enne ravi alustamist tuleb kontrollida patsiendi neerufunktsiooni. Neerufunktsiooni häire korral võib olla vajalik kasutada etambutooli väiksemaid annuseid.
- kui teil tekivad ravi ajal hepatiidile iseloomulikud sümptomid (söögiisu langus, palavik, kõhuvalu) või üldine halb enesetunne. Sellisel juhul tuleb kontrollida teie maksafunktsiooni näitajaid.

#### Muud ravimid ja etambutool

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Etambutooli ei tohi võtta samaaegselt alumiiniumhüdroksiidi sisaldavate antatsiididega (kasutatakse kõrvetiste korral), sest nende toimel etambutooli toime väheneb.

**Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos etambutooliga.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Etambutooli ei tohi võtta raseduse ega rinnaga toitmise ajal muul juhul, kui äärmisel vajadusel.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Etambutool võib kahjustada teie silmanägemist või põhjustada teisi kõrvaltoimeid, nt tundlikkuse häireid, mis halvendavad teie võimet juhtida autot või töötada masinatega. Kui teil on tekkinud sellised kõrvaltoimed, siis ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

## **3. Kuidas etambutooli võtta**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### Annustamine

Etambutooli annused võivad erinevatel patsientidel olla väga erinevad sõltuvalt patsiendi vanusest, kehakaalust ning ka sellest, kas ravimit kasutatakse haiguse ennetamiseks või raviks. Patsiendid, kellel on probleeme neerudega, võivad vajada väiksemaid annuseid.

Täpse annuse määrab igale patsiendile individuaalselt tema raviarst.

Tavapärane annus täiskasvanule nakkuse ennetamiseks ja nakkuse *esmakordseks raviks* on 15 mg/kg kehakaalu kohta päevas. Nakkuse *teistkordsel ravimisel* manustatakse tavapäraselt 25 mg/kg kehakaalu kohta päevas ravi esimese 60 päeva vältel, millele järgnevalt vähendatakse annust 15 mg/kg kehakaalu kohta päevas. Ravi kestuse otsustab arst.

Tavapärane annus lastele nakkuse ennetamiseks on 15 mg/kg kehakaalu kohta päevas. Nakkuse *esma- ja teistkordseks raviks* manustatakse tavapäraselt 25 mg/kg kehakaalu kohta päevas ravi esimese 60 päeva vältel, millele järgnevalt vähendatakse annust 15 mg/kg kehakaalu kohta päevas. Ravi kestuse otsustab arst.

Eakate puhul kasutatakse tavapäraselt täiskasvanute annuseid, v.a. juhul, kui patsiendil on neerufunktsiooni häire. Sellisel juhul on vajalik kasutada väiksemaid annuseid.

### Manustamine

Etambutooli tablette tuleb neelata tervelt koos veega. Ravimit manustatakse üks kord päevas.

### **Kui te võtate etambutooli rohkem kui ette nähtud**

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

### **Kui te unustate etambutooli võtta**

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate etambutooli võtmise**

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

- Hingamisraskus, vilisev hingamine, näoturse (sh silmalaugude, huulte turse) või kõriturse, naha punetus, südame löögisageduse muutused (need on raske eluohtliku allergilise reaktsiooni sümptomid)
- Silmanägemise halvenemine või muud probleemid silmadega (hägune nägemine, silmavalu, värvipimedus).

Samuti pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

- Väga raske ja ulatuslik villiline lööve nahal ja limaskestadel koos üldise halva enesetunde ja palavikuga (Stevensi-Johnsoni sündroom).
- Naha ja silmavalgete kollasus ja väljaheite muutumine heledamaks (need nähud võivad viidata maksafunktsiooni häirele).
- Alasejavalu ja urineerimisraskused (võivad viidata neerufunktsiooni häirele).
- Verevalumite ja verejooksude tekkimine tavalisest kergemini (võivad viidata vereloomehäirele).

Etabmutool võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:

Närvisüsteemi häired:

Harv: tundlikkuse häired (tundetuse või torkimistunne)

Väga harv: pearinglus, segasus, hallutsinatsioonid, peavalu, palavik

Üldised häired:

Väga harv: üldine halb enesetunne

Esinemissagedus teadmata: värisemine

Seedetrakti häired:

Esinemissagedus teadmata: seedehäired, kõhuvalu, metalli maitse suus, söögiisu vähenemine, kaalulangus, iiveldus, kõhulahtisus, kõhupuhitus

Lihaskoe ja sidekoehaigused:

Väga harv: liigesvalu, käte ja jalgade nõrkus

Hingamissüsteemi häired:

Väga harv: vedeliku kogunemine kopsu, kospupõletik, selle tulemusena õhupuudustunne, kõha, palavik

Maksa ja sapiteede häired:

Esinemissagedus teadmata: naha ja silmavalgete kollasus, hepatiit, maksaensüümide taseme tõus veres

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.raviamet.ee](http://www.raviamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas etambutooli säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Muu teave**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.**