

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lidokaiin, 10%, nahasprei

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on lidokaiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne lidokaiini kasutamist
3. Kuidas lidokaiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas lidokaiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on lidokaiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine lidokaiin on paikne tuimesti. Lidokaiini nahasprei pihustamisel limaskestadele tekib pihustamisalal ajutine tundlikkuse kadumine. Spreid kasutatakse tuimestuse ja valuvaigistamise eesmärgil järgmistel põhjustel:

- enne meditsiiniliste instrumentide sisseviimist hingamissüsteemi ja seedetrakti meditsiinilisel läbivaatusel;
- seoses väiksemate kirurgiliste protseduuridega neelus, kõris, suuõõnes ja ninas;
- ninakõrvalurgete (paranasaalsiinused) punktsioonil;
- günekoloogilised ja sünnitusega seotud protseduurid, näiteks normaalse sünnitegevuse viimased staadiumid, rebenenud limaskestade õmblus, emakakaelabiopsia;
- seoses hambaravi protseduuridega (näiteks enne süsti, hambajäljendi võtmisel, röntgenpildi tegemisel, hambakivi eemaldamisel)

2. Mida on vaja teada enne lidokaiini võtmist

Ärge võtke lidokaiini:

- kui olete lidokaiini suhtes allergiline;
- kui olete allergiline (ülitundlik) mõne teise sama tüüpi paikse tuimesti suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne lidokaiini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

- te põete südamehaigust, sealhulgas südamepuudulikkust;
- te põete osalist või täielikku südameblokaadi;
- teil on maksa- või neeruhaigus;
- te põete porfüüriat;
- te olete vanemaealine (üle 65 a).

Lapsed ja noorukid

Lidokaiini nahaspreid võib kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja lidokaiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit enne lidokaiini nahasprei kasutamist, kui te kasutate ebaregulaarse südametegevuse vastaseid ravimeid (antiarütmikume). Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada tõenäosust toksilise toime tekkeks, mida kirjeldatakse lõigus „Kui te kasutate lidokaiini nahaspreid rohkem kui ette nähtud“. Lidokaiini nahasprei õige annuse arvestamisel tuleb arvestada teiste samaaegselt kasutatavate ravimitega.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos lidokaiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Lidokaiini võib raseduse ajal kasutada. Lidokaiin võib väikestes kogustes erituda rinnapiima, mis imikut tõenäoliselt ei ohusta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lidokaiini kasutamise järgselt samal päeval ärge juhtige autot või kasutage masinaid või mehhanisme, sest olenevalt annusest võivad paiksed tuimestid mõjutada vaimset seisundit ning ajutiselt häirida koordinatsiooni ja liigutusi, olles seega liiklusohutlikud.

3. Kuidas lidokaiini kasutada

Teie arst määrab, millises annuses lidokaiini nahaspreid kasutada. Annus sõltub meditsiinilise protseduuri tüübist ja asukohast.

Kui te kasutate lidokaiini rohkem kui ette nähtud

Esimesteks tundemärkideks, et olete lidokaiini nahaspreid on kasutatud üleannuses, on tavaliselt segasus, huulte ja suupiirkonna nahatundlikkuse kadumine, kuulmishäired. Raskemal juhul tekivad kõnehäired, nägemishäired, lihasvärin. Sellele võivad järgneda teadvuse kadumine ja krampid, mis võivad kesta mõnest sekundist mitme minutini.

Kui lidokaiini nahasprei pihustamine lõpetatakse koheselt esimeste üleannustamise sümptomite ilmnemisel, muutub raskete üleannustamise sümptomite risk minimaalseks.

Kui te panete tähele mingeid sümptomeid, mis on sarnased ülalpool kirjeldatule, teatage kohe oma arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või Meditsiiniõega

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lidokaiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Lõpetage lidokaiini nahasprei kasutamine ja otsige otsekohe arstiabi, kui ilmnevad järgmised

allergilised reaktsioonid:

- kui teil ilmnevad hingamisraskused või näo, huulte, keele ja/või kõriturse;
- kui teil ilmneb näo, huulte, keele ja /või kõriturse, mis võib põhjustada neelamisraskusi;
- kui teil ilmneb tugev nahasügelus (koos nahalööbega).

Lidokaiini nahasprei võib pihustamisalal põhjustada paikset ärritust.

Harva (vähem kui ühel kasutajal tuhandest) võib selliste paiksete tuimestite, nagu lidokaiin, kasutamisel tekkida allergilisi reaktsioone (kõige raskemal juhul anafülaktilist šokki). Anafülaktilise šoki tunnusteks on lööve, turse, palavik, hingamisraskused ja teadvusekaotus. Kui teil tekivad sellised tõsised allergilised sümptomid, otsige otsekohe arstiabi.

Harva võib tekkida neuroloogilisi häireid. Need on tavaliselt seotud vale süstimistehnika või patsiendi raske üldseisundiga. On tekkinud püsivaid tundeäireid.

Äge süsteemne toksilisus võib tekkida lidokaiini kiire imendumise järgselt tekkinud kõrge sisalduse tõttu vereplasmas (vt lõik „Kui te kasutate lidokaiini rohkem kui ette nähtud“)

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas lidokaiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Säilitamisel temperatuuril alla 8 °C võib tekkida sade, mis kaob toatemperatuurini soojendamisel.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Teie arst või hambaarst vastutab selle ravimi säilitamise eest. Pihustusdüüsid ei ole korduvkasutamiseks.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2022.