

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

**Pakendi infoleht: teave kasutajale**  
**Granisetroon, 1 mg, tahke suukaudne ravimvorm**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on granisetroon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne granisetrooni kasutamist
3. Kuidas granisetrooni kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas granisetrooni säilitada
6. Muu teave

#### **1. Mis ravim on granisetroon ja milleks seda kasutatakse**

Granisetrooni kasutatakse keemia- ja kiiritusraviga kaasneva iivelduse ja oksendamise ennetamiseks ja raviks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5-HT<sub>3</sub> retseptori antagonistideks.

#### **2. Mida on vaja teada enne granisetrooni kasutamist**

##### **Granisetrooni ei tohi kasutada:**

- kui te olete granisetrooni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes (loetletud pakendil) suhtes allergiline.

Kui te pole milleski kindel, rääkige enne granisetrooni võtmist oma arsti või apteekriga.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne nende tablettide kasutamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, eriti juhul:

- kui teil esineb soolefunktsiooni häireid soolesulguse tõttu.
- kui teil on probleeme südamega, kui te saate vähiravi ravimiga, mis teadaolevalt kahjustab südant või teil on muutunud soolade, näiteks kaaliumi-, naatriumi- või kaltsiumi-sisaldus organismis (elektrolüütide tasakaaluhäired).
- kui te võtate teisi 5-HT<sub>3</sub> retseptori antagonistide. Nendeks on dolasetroon, ondansetroon, mida kasutatakse sarnaselt granisetrooniga iivelduse ja oksendamise raviks ja vältimiseks.

Serotoniini sündroom on aeg-ajalt esinev, kuid potentsiaalselt eluohtlik reaktsioon, mis võib tekkida granisetrooni kasutamisel (vt lõik 4). See võib põhjustada tõsiseid muutusi aju, lihaste ja seedetrakti talitluses. See reaktsioon võib tekkida granisetrooni kasutamisel üksinda, kuid see tekib suurema tõenäosusega granisetrooni kasutamisel koos teatud teiste ravimitega (eriti kasutamisel koos fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, fluvoksamiini, tsitalopraami, estsitalopraami, venlafaksiini, duloksetiiniga).

Rääkige arstile, meditsiiniõele või arstile kindlasti kõikidest kasutatavatest ravimitest.

## **Lapsed**

Lapsed ei tohi neid tablette võtta.

## **Muud ravimid ja granisetroon**

Teatage oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See on vajalik sellepärast, et granisetroon võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Samuti võivad mõned teised ravimid mõjutada granisetrooni toimet.

Eriti tähtis on teavitada oma arsti või meditsiiniõde, kui te kasutate või võite olla kasutanud mis tahes muid ravimeid:

- ravimid, mida kasutatakse ebakorrapärase südamegevuse raviks, teised 5-HT<sub>3</sub> retseptori antagonistid, näiteks dolasetroon või ondansetroon (vt ülal lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
- fenobarbitaal, mida kasutatakse epilepsia raviks;
- ketokonasool, mida kasutatakse seennakkuste raviks;
- antibiootikum erütromütsiin, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks;
- SSRI-d (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni ja/või ärevuse raviks. Sellisteks ravimiteks on näiteks fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, fluvoksamiin, tsitalopraam, esitsitalopraam;
- SNRI-d (serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni ja/või ärevuse raviks. Sellisteks ravimiteks on näiteks venlafaksiin, duloksetiin.

## **Granisetroon koos toidu ja joogiga**

Ravimi samaaegne manustamine koos toiduga mõjutab imendumist minimaalselt.

## **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Granisetrooni ei tohi kasutada juhul, kui te olete rase, üritate rasestuda või toidate last rinnaga, välja arvatud juhul, kui arst on seda soovitanud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, meditsiiniõde või apteekriga.

## **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Granisetroon ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

## **3. Kuidas granisetrooni kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõde või apteekriga.

Granisetrooni soovitatav annus varieerub sõltuvalt patsiendist. See sõltub teie vanusest, kehakaalust ning sellest, kas seda ravimit manustatakse teile iivelduse ja oksendamise vältimiseks või raviks. Arst määrab, kui palju ravimit teile manustada.

## **Iivelduse või oksendamise vältimine**

Granisetrooni esimene annus manustatakse tavaliselt tund enne kiiritus- või keemiaravi alustamist.

Annus manustatakse kas:

- ühe 1 mg tabletina kaks korda ööpäevas või
- kahe 1 mg tabletina üks kord ööpäevas kuni ühe nädala jooksul pärast kiiritus- või keemiaravi.

### **Iivelduse või oksendamise ravi**

Annus manustatakse tavaliselt kas:

- ühe 1 mg tabletina kaks korda ööpäevas või
- kahe 1 mg tabletina üks kord ööpäevas

### **Kui te võtate granisetrooni rohkem, kui ette nähtud**

Kui arvate, et olete võtnud liiga palju tablette, rääkige oma arsti või meditsiiniõega. Üleannustamise sümptomid on kerged peavalud. Teid ravitakse sõltuvalt teil esinevatest sümptomitest.

### **Kui te unustate granisetrooni võtta**

Kui arvate, et ravim on jäänud võtmata, rääkige oma arsti või meditsiiniõega.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate granisetrooni kasutamise**

Ärge lõpetage ravimi võtmist enne ravikuuri lõppu. Kui te lõpetate ravimi võtmise, võivad sümptomid tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

### **Kui te võtate granisetrooni rohkem, kui ette nähtud**

Kui te võtate granisetrooni rohkem kui ette nähtud, konsulteerige oma arstiga.

Üleannustamise sümptomid kattuvad suurelt osalt kõrvaltoimetega. Võimalikud on seedetrakti nähud ning vee ja elektrolüütide tasakaalu häired.

### **Kui te unustate granisetrooni võtta**

Ärge võtke kahekordset annust kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui te märkate järgmist probleemi, peate otsekohe pöörduma arsti poole:

- allergilised reaktsioonid (anafülaksia). Nähtudeks võivad olla kõri-, näo-, huulte ja suuturse, hingamis- või neelamisraskus.

Muud kõrvaltoimed, mis võivad tekkida selle ravimi võtmise ajal:

*Väga sage: võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st*

- peavalu.
- kõhukinnisus. Arst jälgib teie seisundit.

*Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st*

- unehäired (unetus).
- maksafunktsiooni häired, mida näitavad vereanalüüsid.
- kõhulahtisus.

*Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st*

- nahalööbed või allergiline nahareaktsioon või nõgestõbi (urtikaaria). Nähtudeks võivad olla punased, ümbritsevast nahapinnast kõrgemad sügelevad muhud.
- südamerütmi muutused ja muutused EKG-s (südamefunktsiooni elektriline salvestis).

- ebanormaalsed tahtmatud liigutused, näiteks värisemine, lihasjäikus ja lihaste kokkutõmbed.
- serotoniini sündroom. Selle nähtudeks võivad olla kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõrge kehatemperatuur ja vererõhk, liigne higistamine ja kiire südametegevus, erutus, segasus,
- hallutsinatsioonid, värisemine, lihaste värinad, tõmbused või jäikus, koordinatsioonihäired ja rahutus.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas granisetrooni säilitada**

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt.

### **6. Muu teave**

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

#### **Abiained**

Abiained vt pakendilt.

**Infoleht on viimati uuendatud mais 2023.**