

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Beetametasoon, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on beetametasoon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne beetametasooni kasutamist
3. Kuidas beetametasooni kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas beetametasooni säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on beetametasoon ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine beetametasoon kuulub kortikosteroidide (hormoonide) hulka.

Beetametasooni kasutatakse ähvardava enneaegse sünnituse korral loote kopsude ettevalmistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne beetametasooni kasutamist

Beetametasooni ei tohi kasutada, kui patsiendil on:

- beetametasooni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergia
- äge ravimata infektsioon

Muud ravimid ja beetametasoon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos beetametasooniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te imetate last, siis pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kuna ähvardava enneaegse sünnituse korral kasutatakse beetametasooni ainult lühikest aega, siis imenub see ravim rinnapiima nii väikeses annuses, et toime imetatavale lapsele ei ole tõenäoline.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole asjakohane. Beetametasooni kasutatakse haiglatingimustes.

3. Kuidas beetametasooni kasutada

Ähvardava enneaegse sünnituse korral manustatakse 1 beetametasooni kuur: 24 tunnise intervalliga 2 12 mg annust beetametasooni lihasesisese süstena.

Rasedale, kes on saanud esialgse beetametasoonikuuri seitse või enam päeva tagasi, kuid kellel endiselt esineb enneaegse sünnituse risk enne 35.+0 gestatsiooninädalat, soovitatakse ühe beetametasooni lisaannuse manustamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kuna ähvardava enneaegse sünnituse korral kasutatakse loote kopsude ettevalmistamiseks beetametasooni ainult lühikest aega, siis ei ole kõrvaltoimete tekkimine tõenäoline.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas beetametasooni säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris ja 2017.