

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Inimese kooriongonadotropiin, 1500 RÜ, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on inimese kooriongonadotropiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne inimese kooriongonadotropiini kasutamist
3. Kuidas inimese kooriongonadotropiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas inimese kooriongonadotropiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on inimese kooriongonadotropiin ja milleks seda kasutatakse

Kooriongonadotropiin on hormoon, mis osaleb organismi sigimis- ja viljakusfunktsioonis. Inimese kooriongonadotropiin on näidustatud kasutamiseks naiste viljatusravis, sh munarakkude saamiseks ja implanteerimiseks.

2. Mida on vaja teada enne inimese kooriongonadotropiini kasutamist

Ärge kasutage inimese kooriongonadotropiini patsiendil:

- kes on kooriongonadotropiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline;
- kellel on suguelundite pahaloomuline kasvaja.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on enne kooriongonadotropiini kasutamist vajalik, kui patsiendil on:

- südamehaigus;
- astma;
- epilepsia;
- migreen;
- neerukahjustus;
- äge porfüüria;
- kilpnäärme või neerupealise funktsioonihäire;
- teadmata põhjusega emaka verejooks;
- munasarja tsüst;
- endometrioos;
- rinnanäärme, munasarja, emaka, hüpotaalamuse või hüpofüüsi kasvaja.

Lapsed ja noorukid

Ravim on mõeldud kasutamiseks viljatusravis. See ravim ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja inimese kooriongonadotropiin

Inimese kooriongonadotropiini koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud. Siiski peab patsient oma raviarstile enne inimese kooriongonadotropiini kasutamist teatama, kui ta kasutab või on hiljuti kasutanud teisi ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Seda ravimit kasutatakse viljatuse korral, mistõttu ei ole see ravim näidustatud kasutamiseks raseduse ja imetamise ajal.

Kliinilised andmed rasedusaegse kasutamise kohta puuduvad.

Ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eeldatavasti ei mõjuta see ravim või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

3. Kuidas inimese kooriongonadotropiini kasutada

Ravimit süstitakse lihasesse või naha alla.

Annus määratakse igale patsiendile individuaalselt sõltuvalt ravivastusest.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Inimese kooriongonadotropiini manustamine võib põhjustada munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi, mille sümptomiteks on:

- kõhuvalu;
- iiveldus, oksendamine;
- vedeliku kogunemine kõhuõõnde(astsiid);
- uriini koguse vähenemine (oligouuria);
- valkude taseme vähenemine veres (hüpoproteineemia);
- vere paksenemine (hemokontsentratsioon).

Lisaks võib inimese kooriongonadotropiini manustamine põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

- turseid ja kaalutõusu;
- peavalu;
- väsimust;
- meeleolu muutusi;
- rinnanäärmete suurenemist ja valu;
- süstekoha reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas inimese kooriongonadotropiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2019.