

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Podofüllotoksiin 5 mg/ml, nahalahus

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on podofüllotoksiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne podofüllotoksiini nahalahuse kasutamist
3. Kuidas podofüllotoksiini nahalahust kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas podofüllotoksiini nahalahust säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on podofüllotoksiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine podofüllotoksiin kuulub viirusevastaste ravimite rühma. Podofüllotoksiini kasutatakse teravate tüügaskasvajate ehk kondüloomide raviks genitaalide piirkonnas.

2. Mida on vaja teada enne podofüllotoksiini nahalahuse kasutamist

Ärge kasutage podofüllotoksiini nahalahust:

- kui kondüloomid paiknevad piirkonnas, mille nahk on katki/kahjustatud või veritseb.
- kui teil on teadaolev ülitundlikkus (allergia) podofüllotoksiini või nahalahuse teiste koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne podofüllotoksiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- Nahalahust tohib kanda ainult haigusest haaratud nahale. Ärge võtke nahalahust sisse suu kaudu.
- Ärge kandke nahalahust kondüloomidele, mis paiknevad peenises, tupes või pärasooles. Nahalahust tohib kanda ainult nahal paiknevatele (väliste) kondüloomidele.
- Vältige nahalahuse manustamist kondüloomi ümbritsevale tervele nahale.
- Vältige nahalahuse silma sattumist, sest see võib põhjustada ärritust. Kui lahus satub kogemata silma, loputage otsekohe rohke veega ja pöörduge nõu küsimiseks arsti poole.
- Ärge katke ravitavat piirkonda kinni (nt plaastriga).

Enne podofüllotoksiini kasutamist peab arst teadma järgmist:

- Kui kondüloomid katavad ala, mis on suurem kui 4 ruutsentimeetrit (umbes postmargi suurus), võib olla vaja, et seda ravimit manustab meditsiiniõde või arst haiglas.

Kui arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Millest tuleb podofüllotoksiini nahalahuse kasutamise ajal hoiduda

- Ravi ajal on soovitatav hoiduda seksuaalelust. Oodake, kuni kondüloomid on kadunud ja nahk paranenud.
- Kondüloomid on nakkavad. Te võite nakkuse anda seksuaalpartnerile või saada nakkuse partnerilt. Kui olete seksuaalvahekorras, peate kasutama kondoomi, vältimaks haiguse levikut ja kaitsmaks partnerit kokkupuute eest podofüllotoksiiniga (sest see on ärritava toimega).

Muud ravimid ja podofüllotoksiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Podofüllotoksiini nahalahust ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

- Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, teavitage sellest oma arsti.
- Kasutage podofüllotoksiin-ravi ajal usaldusväärset rasestumisvastast meetodit.
- Kui te rasestute podofüllotoksiini kasutamise ajal, teavitage sellest oma arsti.

Podofüllotoksiini nahalahuse kasutamise ajal ei soovitata last rinnaga toita. Arutage oma arstiga, kas valite rinnaga toitmise või ravi podofüllotoksiiniga.

3. Kuidas podofüllotoksiini nahalahust kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kasutage podofüllotoksiini nahalahust kaks korda päevas (hommikul ja õhtul) kolmel päeval.
- Järgmise nelja päeva jooksul ärge lahust kasutage. 7-päevane tsükkel moodustab ühe ravikuuri.
- Kui 7 päeva möödudes on kondüloomid alles, korrake ravikuuri.
- Lubatud on maksimaalselt neli ravikuuri.
- Kui kondüloomid on alles ka pärast nelja ravikuuri, pidage nõu oma arstiga.
- Kuna podofüllotoksiini lahus on tuleohtlik, ei tohi te selle pealekandmise ajal ega vahetult pärast seda suitsetada ega viibida lahtise leegi lähedal.

Kuidas podofüllotoksiini nahalahust kasutada

1. Pesta kahjustatud piirkonda seebi ja veega ning kuivatada õrnalt käterätiga.
2. Podofüllotoksiini nahalahuse igakordsel manustamisel tuleb kasutada uut aplikaatorit.
3. Kasta aplikaatori (aasakujuline) ots lahusesse. Kui teil on suur kondüloom või väikesel alal palju kondüloome, kastke lahusesse aplikaatori teine (labidakese kujuline) ots.
4. Kandke lahus kondüloomile, kuni see on lahusega kaetud ja laske sellel kuivada. Olge ettevaatlik, et lahus ei sattuks tervele nahale. Kui see peaks juhtuma, peske lahus maha seebi ja veega.
5. Korrake protseduuri, kandes lahust kõikidele kondüloomidele. Laske podofüllotoksiini nahalahusega ravitud nahal kuivada, enne kui see puutub kokku teiste nahapindadega.
6. Pärast lahuse kasutamist peske käed hoolikalt puhtaks.

Kui te unustate podofüllotoksiini nahalahust kasutada

Kasutage podofüllotoksiini nahalahust niipea, kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse aeg, oodake kuni selle ajani. Ärge manustage ravimi kahekordset annust.

Kui te kogemata neelate podofüllotoksiini nahalahust alla

Allaneelamise korral võivad lahuse koostisosad olla kahjulikud. Kui lahus sattub kogemata suhu, loputage suud otsekohe veega. Kui te kogemata neelate lahust alla, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage podofüllotoksiini nahalahuse kasutamine ja pöõduge kohe arsti poole:

- Ravitava naha tugev põletus- ja torkimistunne, valu, verejooks või turse. Nende sümptomite tekkimisel peske lahus kohe maha seebi ja veega.
Võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest

- Naha erosioon, manustamiskoha ärritusnähud, sh punetus, sügelus, põletustunne

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest tuhandest

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud ravimi manustamiskohas:

- allergiline reaktsioon, valu, turse, verejooks, söövituskahjustus, naha pindmise kihi kahjustus või kaotus, haavaeritis, nahahaavand, koorik, naha värvuse muutus, naha kuivus, villid

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas podofüllotoksiini nahalahust säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2020