

PAKENDI INFOLEHT
Toldimfos, 100 mg/ml süstelahus

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

Toldimfos (naatriumtrihüdraadina) 100 mg (vastab 80,36 mg toldimfos-naatriumile)

2. LOOMALIIGID

Veis.

3. NÄIDUSTUS(ED)

Akuutse hüpofosfateemia ravi.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada neerupuudulikkusega loomadel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

5. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest www.ravimiamet.ee kaudu.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramuskulaane manustamine.

2 mg toldimfosi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 2,49 ml ravimile 100 kg kehamassi kohta ööpäevas. Manustamist korratakse iga päev kuni kliinilise toime ilmnemiseni või kuni maksimaalselt 10 korda.

Kasutada aseptika nõudeid kogu protseduuri vältel.

7. KEELUAEG

Vastavalt pakendil märgitud liikide keeluaajale .

Kui pakendile ei ole märgitud keeluaega neile liikidele, kellel ravimit kasutada soovitakse, siis põllumajandusministri määruse nr 21 (Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord) järgi tuleb määramata keeluaaja puhul kohaldada loomsetele saadustele järgmisi minimaalseid keeluaegu:

munad – 7 päeva

piim – 7 päeva

lindudelt ja imetajatelt, välja arvatud hobuselt, pärinev liha, sealhulgas rasv ja tapasaadused – 28 päeva
hobuse liha ja tapasaadused – 60 päeva

kala – 500 kraadööpäeva (kraadööpäev on keskmise veetemperatuuri ja ööpäevade korrutis)

8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

9. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinuse ajal

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2019

12. LISAINFO

Müügiloata ravim