



Annus

Kasside herpesviiruse ravi: 40-90 mg iga 8 tunni järel. Ravi kestus 3 nädalat.  
Tablette on soovitatav anda koos toiduga.

## **7. KEELUAEG**

Ei rakendata.

## **8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale – vaata pakendilt.

## **9. ERIHOIATUSED**

### Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse perioodil ei ole tõestatud. Kasutamine tiinuse ja imetamise ajal ei ole soovitatav.

### Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Digoksiini farmakokineetika ei muutunud famtsikloviiri (500 mg) ühekordsete või korduvate (kolm korda päevas) annuste samaaegsel manustamisel.

## **10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

November 2020

## **12. LISAINFO**

**Müügiloata ravim.**