

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Imidokarb, 85 mg/ml süstelahus**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.**

**1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

1 ml süstelahust sisaldab:

**Toimeaine:**

Imidokarb 85 mg (imidokarbdiproprionaati 121,15 mg/ml)

**2. LOOMALIIGID**

Koer.

**3. NÄIDUSTUS(ED)**

Babesioosi ravi.

**4. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte manustada intravenoosselt.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

**5. KÕRVALTOIMED**

Võib esineda kergeid kolinergilisi toimeid (nt süljevool, oksendamine, diarröa, lõõtsutamine, rahutus). Neid kõrvalnähte saab leevendada atropiinsulfaadi manustamisega.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

**6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Subkutaaneks või intramuskulaarseks manustamiseks. Subkutaanne süste teha kaela taha lahtise nahavoldi alla.

6,6 mg toimeainet 1 kg kehamassi kohta ühekordse süstena. Vajadusel korrata ravi 7, 14 või 21 päeva pärast.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.

**7. KEELUAEG**

Ei rakendata.

## **8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitustingimusi vt pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

## **9. ERIHOIATUSED**

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Suurimate soovitatud annuste manustamine võib olla valulik ja kutsuda loomadel esile enesekaitse reaktsiooni. Mõned koerad on selle valu suhtes eriti tundlikud.

Ravimi käsitlemisel tuleb olla ettevaatlik, sest sellega võivad kaasuda antikolinesteraarsed toimed.

Nahale sattunud ravimi piisad tuleb viivitamatult veega maha pesta. Ravimi käsitlemise ajal tuleb kanda sobivaid kaitserõivaid (nt kummikindaid).

Kui ravimi käsitlemise ajal ilmnevad antikolinesteraasile toimele viitavad nähud, tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

## **10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÖLASTAMISE KUUPÄEV**

Detsember 2019

## **12. LISAINFO**

**Müügihoata ravim.**