

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Kloortetratsükliin, 10 mg/g silmasalv**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.**

**1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

1 gramm silmasalvi sisaldab 10 mg kloortetratsükliinvesinikkloriidi

**2. LOOMALIIGID**

Kass

**3. NÄIDUSTUS(ED)**

Kloortetratsükliinile tundlike bakterite põhjustatud konjunktiviidi ravi.

**4. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust kloortetratsükliini suhtes.

**5. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

**6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Kanda 0,5...2 cm salvi (olenevalt looma suurusest) konjunktivaalkotti 4 korda päevas 5 päeva jooksul. Kui pärast 3-päevast ravi ei ole kliinilise paranemise märke ilmnenud, tuleb kaaluda alternatiivset ravi.

**7. KEELUAEG**

Ei rakendata.

**8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

**9. ERIHOIATUSED**

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Arvestades bakterite tetratsükliinitundlikkuse tõenäolist varieeruvust, tuleks võtta proovid mikroorganismide antibiootikumitundlikkuse määramiseks. Ravimi kasutamine erinevalt pakendi infolehes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust kloortetratsükliinile ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste tetratsükliinidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Võimaliku tundlikkuse suurenemise ja/või ülitundlikkusreaktsioonide tekkimise tõttu tuleb

manustamisel vältida ravimi otsest kokkupuudet nahaga.

Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil

Ravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

**10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

**11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Mai 2019

**12. LISAINFO**

**Müügiloata ravim**