

PAKENDI INFOLEHT
Medroksüprogesteron, 5 mg tabletid kassidele ja koertele

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 tablett sisaldab:

Toimeaine:

Medroksüprogesteron (atsetaadina) 5 mg

2. LOOMALIIGID

Kass ja koer.

3. NÄIDUSTUS(ED)

Pikaajaline inna edasilükkamine kassidel.

Lühiajaline inna katkestamine koertel.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada loomadel enne suguküpsuse saabumist.

Mitte kasutada tiinetel või tiinuse kahtlusega loomadel.

Mitte kasutada suguelundite patoloogiaga või innatsükli anomaaliatega loomadel või loomadel, kellel on kalduvus mädaemaka tekkeks.

Mitte kasutada lakteerivatel kassidel.

Mitte kasutada koertel või kassidel, kellel on diagnoositud maksa või pankrease haiguseid.

Mitte kasutada koertel või kassidel, kellel on diagnoositud suhkrutõbi ja/või akromegaalia.

Mitte kasutada pikaajaliselt proöstruse, östruse ja metöstruse faasis, kuna see võib suurendada riski tsüstilise endomeetriumi hüperplaasia tekkeks ning seda eriti eakamatel loomadel.

Mitte kasutada sigimis- või teiste organite neoplaasiaga loomadel.

5. KÕRVALTOIMED

Pikaajagse MPA (medroksüprogesteronatsetaadi) manustamise korral võivad tekkida neerupealiste, piimanäärmete, pankrease ja maksa ebanormaalsed muutused.

MPA (medroksüprogesteronatsetaadi) manustamisel proöstruse või östruse faasis võivad kaasnedagi muutused endomeetriumis.

Ravi alguses võib märgata järgnevaid mööduvaid kõrvaltoimeid:

- suurenenud söögiisu ja kehamassi suurenemine (vajadusel tuleb vähendada toidu kogust)
- muudatused käitumises
- piimanäärmete suurenemine

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest www.ravimiamet.ee kaudu.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudseks manustamiseks.

Lühiajaline jooksuaja katkestamine kassidel 2,5 – 5 kg:
1 tablett päevas 8 päeva järjest.

Lühiajaline jooksuaja katkestamine koertel kuni 5 kg:
2 tabletti päevas esimesed 3 päeva, sealt edasi 1 tablett päevas kuni 11 päeva

Koertel üle 5 kg:
3 tabletti päevas esimesed 3 päeva ja sealt edasi 1,5 tabletti päevas kuni 11 päeva

Inna ärahoidmiseks kassidel 2,5 – 5 kg:
0,5 tabletti 3 korda nädalas, 4 nädala jooksul

Koertel kuni 10 kg:
0,5 tabletti päevas 15 päeva jooksul

Koertel 10 – 20 kg:
1 tablett päevas 15 päeva jooksul

Koertel üle 20 kg:
2 tabletti päevas 15 päeva jooksul

Osadel emastel kassidel on raske eristada anöstruse ja diöstruse faasi ning samuti on oht mainitud seisundid segi ajada varajase tiinusega. Võib olla vajalik isoleerida kass üheks innaperioodiks, et tagada ravimi manustamise algus diöstruse faasis.

Mõnikord võib loom hakata indlema ebaõige manustamise aja või vale annustamise tõttu.

Kui koera ind on katkestatud medroksüprogesterooni tablettidega, algab järgmine ind arvatust mõnevõrra varem.

Kassidel on järgmise inna algus varieeruv.

7. KEELUAEG

Ei rakendata.

8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

9. ERIHOIATUSED

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal on vastunäidustatud.

Pikaajalise manustamise korral tuleks võimaldada ravimivabad perioodid, et vältida neerupealiste, piimanäärmete, pankrease ja maksa ebanormaalseid muutusi, mis võivad tekkida MPA (medroksüprogesteroonatsetaadi) pideval manustamisel. Vältida tuleb preparaadi kasutamise järsku lõpetamist. Kui see juhtub, tuleb patsienti ja tema neerupealiste funktsiooni hoolikalt jälgida.

Vanemate loomade puhul on soovitatav regulaarne kliiniline ülevaatus, kuna on suurenenud oht suhkurtõve ja/või akromegaalia tekkeks.

Pärast inna katkestamist võivad ilmned muutused endomeetriumis.

Juhuslikul ravimi alla neelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast ravimi manustamist pesta käed.

10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2019

12. LISAINFO

Müügilooma ravim