

PAKENDI INFOLEHT
Sukralfaat, 1 g tabletid

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

Toimeaine:

1 g sukralfaati

2. LOOMALIIGID

Koer, kass.

3. NÄIDUSTUS(ED)

Mao- või kaksteistsõrmikuhaavandite täiendavaks raviks.

Sukralfaat toimib ainult paiksel – ta kaitseb maolimaskesta kahjustuste eest ja moodustab kahjustuse (sh haavandi või erosiooni) piirkonnas eksudaadi valkudega kaitsva kihi. See kiht kaitseb maolimaskesta kahjustusi pepsiini, maohappe ja sapphapete soolade seediva toime eest.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

5. KÕRVALTOIMED

Raskete kõrvaltoimete ilmnemisel (allergiline reaktsioon: hingamishäired, tursed näo, keele ja mokaade piirkonnas, lööve) lõpetage kohe ravimi manustamine ja võtke ühendust oma veterinaararstiga. Sukralfaat võib põhjustada kõhukinnisust.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest www.ravimiamet.ee kaudu.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Tavapärase annusena manustatakse kassidele 250 mg 2 kuni 3 korda päevas, koertele 500 mg kuni 1 g sukralfaati 3 kuni 4 korda päevas.

Sukralfaadi tablette tuleb manustada tühja kõhuga loomadele, 1 tund enne või 2 tundi pärast söögikorda.

7. KEELUAEG

Ei rakendata.

8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

9. ERIHOIATUSED

Sukralfaat võib mõjutada teiste samaaegselt manustatud ravimite imendumist. Seoses sellega ei ole soovitatav 2 tundi pärast sukralfaati sisaldava ravimi manustamist anda loomale teisi ravimeid.

Tiinetel ja imetavatel loomadadel kasutada ettevaatusega.

Sukralfaadi üleannustamine võib põhjustada kõhukinnisust.

10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2019

12. LISAINFO

Müügilooma ravim