

PAKENDI INFOLEHT
Sulfadasiin 400 mg + trimetoprim 80 mg, tabletid

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 tablett sisaldab:

Toimeaine:

Sulfadasiin 400 mg
Trimetoprim 80 mg

2. LOOMALIIGID

Koer.

3. NÄIDUSTUS(ED)

Trimetoprimi ja sulfadasiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada kui esineb:

- ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainetes suhtes
- katarakt
- rakse maksa- või neerupuudulikkus
- vereloomesüsteemi häire
- vedelikupuudus või risk selle tekkeks

5. KÕRVALTOIMED

Potentseeritud sulfoonamiide kasutamisel on esinenud keratokonjunktiviiti (kuiva silma sündroom) ja polüartropaatiat.

Pikaaegse ravi korral võib esineda katarakti ja kristallide sadestumist (hematuuria, kristalluuria, tahtmatu urineerimine).

Võib esineda allergiat ja seedeprobleeme, äärmistel juhtudel ka neeru- ja maksapuudulikkust, hepatiiti.

Ülalmainitud kõrvaltoimete esinemisel lõpetada ravi ning tulevikus sarnaste ravimite kasutamist vältida.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest www.ravimiamet.ee kaudu.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudne.

25 mg sulfadasiini ja 5 mg trimetoprimi 1 kg kehamassi kohta (vastab 1 tabletile 16 kg kehamassi kohta) ööpäevas kuni 5 päeva. Annust tuleks jagada kaheks ning anda iga 12 tunni tagant.

Ravi tuleks jätkata veel 2 päeva pärast sümptomite kadumist.

Kui pärast 3 päevast ravi pole kliinilised sümptomid nähtavalt kaduma hakanud, tuleks diagnoos üle vaadata ning vajadusel raviplaani muuta.

7. KEELUAEG

Ei rakendata.

8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

9. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel.

Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikroobse ravi printsiipe.

Ravimi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada resistentsete bakterite tekkimise riski ja võib väheneda ravi efektiivsus võimaliku ristresistentsuse tõttu teiste antibiootikumidega.

Raviga kaasnedava võiva neerukahjustuse ja kristalluuria vältimiseks tuleb tagada piisav vedeliku tarbimine.

Ravi ootamatu katkestamine võib kaasa tuua resistentsete haigustekitajate tekkimise.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Sulfoonamiidid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada

ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus sulfoonamiididele võib tekitada ristuvat reaktsiooni teiste

antibiootikumidega ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja

näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised

sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus

Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Prokaiiniga samaaegselt kasutamine võib sulfoonamiidide toimet inhibeerida kuna prokaiin on paraaminobensoehappe prekursor.

10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsi oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2020

12. LISAINFO

Müügiloota ravim