

PAKENDI INFOLEHT
Tsüklosporiin, 2 mg/g silmasalv koertele

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. TOIMEAINE SISALDUS

Toimeaine:

Tsüklosporiin 2 mg/g

2. LOOMALIIGID

Koer.

3. NÄIDUSTUS(ED)

Kuiva silma sündroom (*keratoconjunctivitis sicca*) ja krooniline pindmine keratiit.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainetega suhtes.
Mitte kasutada kui kahtlustate silma seen- või viirusnakkust.

5. KÕRVALTOIMED

Manustamise esimestel päevadel võib esineda silmaärritust (punetus, silmalaua spasm, konjunktiviit). Kasutamine tuleb lõpetada kui ärritus püsib kauem kui 7 päeva. Ravim võib põhjustada silmalaua naha põletikku ja turset.

Liigse koguse ravimi manustamisel võib see silmaümbruses põhjustada karvakadu, sügelust ja nahakahjustusi.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest www.raviamet.ee kaudu.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Okulaarne.

Manustada väike kogus salvi (umbes ½ cm) konjunktiviikotti 1-2 korda päevas.

Enne salvi manustamist eemaldada silmast mädane eritis, puhastades või loputades sobiva silmi mitte ärritava lahusega.

7. KEELUAEG

Ei rakendata.

8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

9. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ravi kestus oleneb ravivastusest.

Kliiniline kogemus näitab, et 90% kuiva silma sündroomiga koertest vajab eluaegset ravi. Parimate tulemuste saavutamiseks alustada ravi võimalikult vara, et hoida ära pisaranäärme epiteeli pöördumatut kahjustust ja fibroosi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Manustamiste vahepeal peab tuub olema korgiga suletud, et vältida ravimi saastumist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravim võib põhjustada naha ja silmade ärritust. Vältida ravimi sattumist nahale ja silma. Ravimi juhuslikul silma sattumisel loputada silmi kohe rohke veega.

Pärast ravimi manustamist pesta käed. Soovitav on manustamise ajal kasutada kindaid.

Tiinus

Veterinaarravimi ohutus tiinuse perioodil ei ole tõestatud. Kasutamine tiinuse ja imetamise ajal ei ole soovitatav.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Üleannustamine võib põhjustada silmalaugude naha põletikku ja turset. Need nähud on seotud liigse ravimi kogusega, mis satub silmaümbruse nahale. Sellisel juhul vähendada järgnevatel manustamiskordadel ravimi kogust.

10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuli 2020

12. LISAINFO

Müügiloata ravim