

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale Beetametasoon, salitsüülhappe salv 0,5mg+30mg/g

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel. Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on beetametasoon+salitsüülhappe salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne beetametasoon+salitsüülhappe salvi kasutamist
3. Kuidas beetametasoon+salitsüülhappe salvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas beetametasoon+salitsüülhappe salvi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on beetametasoon+salitsüülhappe salv ja milleks seda kasutatakse

Beetametasoon+salitsüülhappe salv sisaldab tugevatoimelist kortikosteroidi beetametasooni (kortisooni-tüüpi hormoon), mis on põletikuvastase toimega, vähendades põletikku, naha punetust ja sügelust; ja salitsüülhapet, mis soodustab beetametasooni tungimist läbi naha, aitab eemaldada kuiva ja sarvestunud nahka.

Beetametasoon+salitsüülhappe salvi kasutatakse psoriaasi, seborroilise dermatiidi, ekseemi ja teiste kortikosteroididele reageerivate põletikuliste (pea)nahahaiguste korral põletiku, kuivuse, sügeluse ja ebamugavustunde leevendamiseks

2. Mida on vaja teada enne beetametasoon+salitsüülhappe salvi kasutamist

Ärge kasutage beetametasoon+salitsüülhappe salvi:

- kui olete beetametasooni, salitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline.
- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon (hääle kähisemine, nahalööve, kublad) teiste glükokortikosteroidide suhtes.
- kui teil on viiruste või bakterite põhjustatud nahahaigused
- kui teil on haavandilised kahjustuskolded
- kui teil on *rosacea*, suuümbruse nahapõletik, naha bakteriaalne-, viirus- (tuulerõuged, herpes) või seeninfektsioon, vaktsineerimisjärgne reaktsioon.
- alla 2 aastastel lastel

Ettevaatust! Ärge kasutage ravimit teiste haiguste ravis. Arst on selle ravimi määranud ainult teie praeguse nahahaiguse raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne beetametasoon+salitsüülhappe salvi kasutamist teatage oma arstile: - kui te olete rase või toidate rinnaga last; - kui te põete teisi haigusi, eriti kui tegemist on infektsiooniga või kui olete diabeetik.

Beetametasoon+salitsüülhappe salvi ei tohi manustada lahtistele haavadele või kahjustatud nahale. See ravim on mõeldud ainult nahale ja peanahale. Vältige ravimi sattumist silma ja limaskestadele (näiteks suhu või ninna) ja mähkmepiirkonda.

Kui te kasutate beetametasoon+salitsüülhappe salvi pikka aega koos mõne teise kortikosteroidraviga, suurtele nahapiirkondadele või oklusioonideme ehk õhukindla sideme all, võivad tekkida kõrvaltoimed.

Kui tekib intensiivne nahaärritus, nahaketendus, muud kõrvaltoimed või infektsioon, tuleb ravi katkestada.

Lapsed ja noorukid, kes kasutavad seda ravimit, peavad olema arsti järelevalve all, sest see ravim imendub läbi naha ning võib mõjutada kasvu või põhjustada teisi kõrvaltoimeid. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 2-aastastel lastel, kuna selle ravimi ohutus ja efektiivsus selles vanuses lastel ei ole kindlaks tehtud.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja beetametasoon+salitsüülhappe

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

3. Kuidas beetametasoon+salitsüülhappe salvi kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine ja manustamine täiskasvanutele ja lastele vanuses alates 12-ndast eluaastast:

Tavaline annus kaks korda päevas õhukese kihina, õrnalt nahale masseerides, 2 nädalat.

Beetametasoon+salitsüülhappe salv on ette nähtud ainult välispidiseks kasutamiseks nahal. Peske käed enne ja pärast salvi pealekandmist.

Ärge kasutage salvi sideme all, kui arst ei soovita seda.

Kasutamine 2-12-aastastel lastel: ravi ei tohi kesta kauem kui 5 päeva.

Kui te kasutate beetametasoon+salitsüülhappe salvi rohkem kui ette nähtud

Ravim on ette nähtud välispidiseks kasutamiseks. Pidage nõu oma arstiga, kui olete ravimit kasutanud suuremates kogustes või pikemaajaliselt kui arsti poolt määratud.

Kui te unustate beetametasoon+salitsüülhappe salvi kasutada

Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset kogust unustatud annuse tasategemiseks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pidage nõu oma arstiga kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed: põletustunne, sügelus, ärritus, infektsioon, kuiv või lõhenenud nahk, näonaha ärritus või punetus, suurenenud karvakasv, vistrikuline nahalööve (akne), nahavärvi muutused, naha õhenemine ja kergesti tekkivad nahavigastused, venitusjäljed nahal, valu või põletik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas beetametasoon+salitsüülhape salvi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 ° C originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2019.