

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

### **Pakendi infoleht: teave kasutajale** **Naatriumnitroprussiid, 50 mg, parenteraalne ravimvorm**

## **Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on naatriumnitroprussiid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne naatriumnitroprussiidi kasutamist
3. Kuidas naatriumnitroprussiidi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas naatriumnitroprussiidi säilitada
6. Muu teave

### **1. Mis ravim on naatriumnitroprussiid ja milleks seda kasutatakse**

Naatriumnitroprussiid lõdvestab veresoonte seintes olevaid silelihaseid ja põhjustab sellega veresoonte (arterite ja veenide) laienemist. See alandab vererõhku.

Naatriumnitroprussiidi kasutatakse kongestiivse südamepuudulikkuse, eluohtliku hüpertensiivse kriisi raviks (sh lõhestuv aordianeürism, feokromotsütoomi kriis) ja vererõhu langetamiseks kirurgiliste operatsioonide ajal.

### **2. Mida on vaja teada enne naatriumnitroprussiidi kasutamist**

#### **Naatriumnitroprussiidi ei tohi kasutada**

- kui olete naatriumnitroprussiidi suhtes allergiline;
- kui teil on pärilik nägemiskaotus (Leberi pärilik optiline neuropaatia);
- kui teil on suitsetamisest tingitud nägemise halvenemine;
- kui teil on olnud insult.

#### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne naatriumnitroprussiidi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga naatriumnitroprussiid, kui teil esineb mõni järgmistest haigustest või seisunditest:

- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on neeruhaigus;
- kui teil on maksahaigus;
- kui teil on aneemia;
- kui teil on epilepsia või mõni muu neuroloogiliste hoogudega kulgev haigus;
- kui teil on hetkel või kunagi olnud ajukasvaja või peapiirkonna trauma.

Kui teil esineb mõni ülaltoodud haigustest või seisunditest, rääkige sellest enne ravimi kasutama hakkamist oma arstile.

Teatage koheselt oma arstile järgmistest tõsisest kõrvaltoimetest: minestustunne (k.a pikali olles), hingamisraskused, pinnapealne hingamine, hingamissageduse kiirenemine, segadustunne, tinnitus

(heli peas või kõrvus), pearinglus, iiveldus, oksendamine, epilepsiale sarnased hood, südamelöögisageduse kiirenemine või aeglustumine, südamelöökide ebakorrapärasus, tuimuse või külmatunne jäsemetes, külmavärinad, higistamine, treemor (värinad) või tõmblused, reflekside ägenemine. Osad nendest sümptomitest võivad viidata liiga suure annuse naatriumnitroprussiidi saamisele.

Erakorralises olukorras ei ole alati võimalik teavitada oma arsti ülaltoodud seisunditest või sellest kui olete rase või imetate. Isegi kui olete juba seda ravimit saanud, teatage arstile kui teil on mõni ülaltoodud seisund või kui olete rase või imetate.

### **Muud ravimid ja naatriumnitroprussiid**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

- vererõhku alandavad ravimid.

### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul kui seda on soovitanud arst.

### **Oluline teave ravimi koostisainete suhtes**

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainetega kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

## **3. Kuidas naatriumnitroprussiidi kasutada**

Seda ravimit manustab teile tervishoiutöötaja. Annuse määrab arst, sõltuvalt teie seisundist ja vereringe näitajatest. Ravimit manustatakse tilkinfusioonina veeni, lahjendatult või lahjendamata, kasutades infusiooniseadet või süstlapumpa.

Kui teil on tunne, et naatriumnitroprussiidi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

### **Kui te kasutate naatriumnitroprussiidi rohkem, kui ette nähtud**

Naatriumnitroprussiidi suurte annuste manustamise tulemusena võib tekkida tugev pearinglus, iiveldus ja oksendamine, lihastõmblused, hingamissageduse kiirenemine, südamelöögisageduse kiirenemine või südameklappimine, minestustunne.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatage koheselt oma arstile, kui teil on allergilise reaktsioonile viitavad sümptomid, sh lööve, raskused hingamisega, kõri, keele, näo või huulte turse.

Teatage koheselt oma arstile järgmistest tõsisest kõrvaltoimetest: minestustunne (k.a pikali olles), hingamisraskused, pinnapealne hingamine, hingamissageduse kiirenemine, segadustunne, tinnitus (heli peas või kõrvus), pearinglus, iiveldus, oksendamine, epilepsiale sarnased hood, südamelöögisageduse kiirenemine või aeglustumine, südamelöökide ebakorrapärasus, tuimuse või külmatunne jäsemetes, külmavärinad, higistamine, treemor (värinad) või tõmblused, reflekside ägenemine.

Esineda võivad ka mittetõsised kõrvaltoimed, näiteks kergekujuline lööve, kõhuvalu, iiveldus, kuumus- või sügelustunne nahal, nahapunetus, infusioonikohareaktsioon.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas naatriumnitroprussiidi säilitada**

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Muu teave**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2021.**