

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prokaiinbensüülpenitsilliin
Süstelahuse pulber, vialis 1 200 000 TÜ

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on prokaiinbensüülpenitsilliin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne prokaiinbensüülpenitsilliini kasutamist
3. Kuidas prokaiinbensüülpenitsilliini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas prokaiinbensüülpenitsilliini säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON PROKAIINBENSÜÜLPENITSILLIIN JA MILLEKS TEDA KASUTATAKSE

Prokaiinbensüülpenitsilliin on prokaiini ja bensüülpenitsilliini sool ning toimib bakteritsiidset penitsilliinile tundlikesse mikroorganismidesse, kuna püüab rakuseina koostisesse kuuluvate mukoproteiinide sünteesi. Ühekordne annus prokaiinpenitsilliini manustatuna lihasesse tagab 24 tundi püsiva penitsilliini efektiivse kontsentratsiooni veres.

Prokaiinbensüülpenitsilliin on näidustatud varase ja hilise ja kaasasündinud süüfilise raviks ning süüfilise raviks rasedatel.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PROKAIINBENSÜÜLPENITSILLIINI KASUTAMIST

Prokaiinbensüülpenitsilliini ei tohi kasutada:

- Kui teil esineb teadaolev ülitundlikkus penitsilliinile või prokaiinile. Ülitundlikkuse korral tsefalosporiinidele tuleb arvestada ristuva allergia võimalusega (5-10% juhtudest).

Teil kasutatavas ravimis sisalduvate abiainetega kohta teavet, palun, küsige oma arstilt. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Allergiliste nähtude ilmnedes tuleb prokaiinpenitsilliini manustamine lõpetada ja alustada asjakohast sümptomaatilist ravi. Kui on selgunud, et allergia on tingitud prokaiinist, võib jätkata ravi penitsilliiniga, mis ei ole prokaiini sool.

Enne prokaiinpenitsilliini kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja prokaiinpenitsilliin

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

See on väga oluline, sest kasutades korraga rohkem kui ühte ravimit, võivad nende toimed tugevneda või nõrgeneda.

Tähelepanu nõuab põletikuvastaste, antireumaatiliste ja palavikku alandavate ravimite samaaegne kasutamine, kuna need võivad konkureerivalt pärssida penitsilliini eritumist.

Enne ravimi kasutamist, palun konsulteerige arstiga.

3. KUIDAS PROKAIINBENSÜÜLPENITSILLIINI KASUTADA

Juhised, millal ja kuidas manustada, annab teile arst või õde.

Seda preparaati tohib manustada ainult lihasesisese süstimise teel.

Ravimpreparaati manustatakse:

- varase süüfilisega patsientidele 600 000 TÜ intramuskulaarselt igapäevaselt 10...14 päeva jooksul
- hilise süüfilisega patsientidele 600 000 TÜ intramuskulaarselt igapäevaselt 17...21 päeva jooksul
- kaasasündinud süüfilisega patsientidele ja süüfilisega rasedatele 50 000 TÜ/kg/annus intramuskulaarselt üks kord päevas 10 päeva jooksul.

Allergilise reaktsiooni ilmnemisel tuleb preparaadi manustamine koheselt lõpetada ja rakendada asjakohast ravi.

Kui teil tekib küsimusi ravimi manustamise kohta, võtke ühendust oma arstiga.

Ärge muutke ise ettenähtud annust.

Kui teile manustatakse prokaiinpenitsilliini rohkem kui ette nähtud

Kui teil on kahtlus, et teile manustati liiga suur annus ravimit, võtke kohe ühendust oma arsti, apteekri või lähima haiglaga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka prokaiinpenitsilliin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetena võivad esineda nii allergilised reaktsioonid kui hematoloogilised nähud. Harvadel juhtudel võib esineda stomatiit ja glossiit. Diarröa tekkimisel antibiootikumravi saaval haigel tuleb mõelda pseudomembranoosse koliidi võimalusele. Süüfilise ravi ajal võib tekkida antigeenide vabanemisest Jarisch-Herxheimeri reaktsioon.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. PROKAIINBENSÜÜLPENITSILLIINI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimpreparaati pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on koostöölstatud detsembris 2013