

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tetrakaiin, 10mg/ml, silma manustatav ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on tetrakaiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne tetrakaiini kasutamist
3. Kuidas tetrakaiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas tetrakaiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on tetrakaiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine tetrakaiin on on silma manustatav anesteetikum. Seda kasutatakse lokaalanesteesiaks katarakti (kae) lõikusel.

Seda ravimit ei tohi kasutada enneaegsetel lastel.

2. Mida on vaja teada enne tetrakaiini kasutamist

Ärge kasutage tetrakaiini:

- kui patsient on tetrakaiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui patsient on teiste sarnast tüüpi anesteetikumide suhtes allergiline
- kui patsient kasutab samaaegselt mõnda sulfoonamiidi
- enneaegsetel lastel

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Tetrakaiin ei ole ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks. Pikaajaline või liiga sagedane tetrakaiini silma manustamine võib kahjustada nägemist.

Enne tetrakaiini manustamist silma tuleb eemaldada kontaktläätsed.

Lapsed ja noorukid

Silma manustatavat tetrakaiini ei tohi kasutada enneaegsetel lastel.

Muud ravimid ja tetrakaiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui tetrakaiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

Tetrakaiini ei tohi kasutada samaaegselt sulfoonamiididega (antibakteriaalse toimega ravimid ja diabeedi korral kasutatavad ravimid).

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos tetrakaiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Selle ravimi ohutus ja efektiivsus rasedatel ja imetavatel emadel ei ole kindlaks tehtud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nagu kõik silma manustatavad ravimid, võib ka tetrakaiin põhjustada hägust nägemist. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid seni, kuni ravimi toime on möödunud.

3. Kuidas tetrakaiini kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt manustab seda ravimit meditsiinitöötaja vahetult enne silma kirurgilist protseduuri. Süsteemset imendumist saab vähendada kui vajutada pisarakotile minuti jooksul ravimi manustamise ajal ja järgselt.

Anesteseeritud silma peab kaitsema tolmu ja bakteriaalse kontaminatsiooni eest.

Kui te kasutate tetrakaiini rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kuna tavaliselt kasutatakse seda ravimit tervishoiuasutuses meditsiinitöötaja poolt, on ravimi üleannustamine vähe tõenäoline. Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tetrakaiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Immuunsüsteemi häired

Tetrakaiin võib põhjustada ülitundlikel patsientidel dermatiiti.

Silma kahjustused

Manustamisel võib esineda kõrvetustunnet, see kestab kuni 30 sekundit.

Silma sarvkesta pindmine põletik (keratiit), sarvkesta turse. Tetrakaiini pikaajasel kasutamisel võib tekkida kornea vigastus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas tetrakaiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016.