

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rõuge- ja ahvirõugevaktsiin (elus, mittepaljunev), 0,5 ml, süstesuspensioon

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on rõuge- ja ahvirõugevaktsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutamist
3. Kuidas rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas rõuge- ja ahvirõugevaktsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on rõuge- ja ahvirõugevaktsiin ja milleks seda kasutatakse

Rõuge- ja ahvirõugevaktsiini on vaktsiin, mida kasutatakse rõugete, ahvirõugete ja vaktsiiniaviiruse põhjustatud haiguse vältimiseks täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutamist

Rõuge- ja ahvirõugevaktsiini ei tohi kasutada

- kui teil on ülitundlikkus või kui teil on kunagi tekkinud äkiline eluohtlik allergiline reaktsioon rõuge- või ahvirõugevaktsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud pakendil) suhtes;

Vaktsineerimise järgselt peab olema kättesaadav meditsiiniline abi, kuna süste tagajärjel võib tekkida raske allergiline reaktsioon või anafülaksia.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on immuunsüsteem nõrgenenud.
- kui teil on atoopiline dermatiit (vt lõik 4).

Kui teil on nõrgenenud immuunsüsteem ja/või kui teil kasutatakse immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid, võib teil olla nõrgem kaitsereaktsioon vaktsiinile.

Kõrge palavikuga haigestumise korral lükkab arst vaktsineerimise edasi seni, kuni tunnete end paremini. Kerge infektsiooni, näiteks külmetushaiguse esinemine ei nõua vaktsineerimise edasilükkamist, aga pidage esmalt nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Vaktsineerimine ei pruugi alati tagada kaitset rõuge- ja ahvirõugete vastu.

Muud ravimid ja rõuge- ja ahvirõugevaktsiin

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga. Seda vaktsiini ei soovitata kasutada raseduse ja imetamise ajal. Sellegipoolest hindab teie arst, kas rõugete ja ahvirõugete põhjustatud haiguse vältimisest tuleneda võiv kasu kaalub üles kaasneda võivad riskid teile ja lootele/imikule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toime kohta autojuhtimise või masinatega töötamise võimele andmed puuduvad. Sellegipoolest võivad mõned lõigus 4 loetletud kõrvaltoimetest (juhul, kui need teil esinevad) mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet (nt pearinglus).

Lapsed

Ei ole piisavalt andmeid, et järeldada ravimi ohutus ja efektiivsus alla 18 aasta vanustel lastel.

Eakad

Kliinilised uuringud rõuge- ja ahvirõugevaktsiiniga ei kaasanud piisavalt üle 65 aasta vanuses uuritavaid ja ei ole teada kas eakatel on erinev reaktsioon vaktsiinile.

3. Kuidas rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutada

Vaktsiini manustab teile meditsiinitöötaja. Ravim manustatakse nahaaluse süstena, soovitatavalt ülajäseme deltalihasesse.

Vaktsiin manustatakse kahe doosina (0,5 ml ühes doosis) 4-nädalase vahega.

Kui teile on varasemalt rõugevaktsiini manustatud, pidage nõu täpsema annustamise osas oma arstiga.

Kui te unustate õigel ajal rõuge- ja ahvirõugevaktsiini 2. annuse saada

Kui plaaniline süst jääb vahele, teatage oma arstile või meditsiiniõele, ning leppige kokku uue visiidi aeg.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Võtke otsekohe arstiga ühendust või pöörduge viivitamatult lähima haigla esmaabiosakonda, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest:

- hingamisraskused,
- pearinglus,
- näo ja kaela paistetus.

Need sümptomid võivad viidata tõsisele allergilisele reaktsioonile.

Teised kõrvaltoimed

Kui teil on atoopiline dermatiit, võivad teie nahareaktsioonid (nagu punetus, paistetus ja sügelemine) ja muud üldsümptomid (nagu peavalu, lihasvalu, halb või väsinud enesetunne) olla ägedamad ning esineda võib ka nahaseisundi ägenemist või halvenemist.

Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed olid süstekohas. Enamik neist olid kerged kuni mõõdukad ja taandusid ilma ravita seitsme päeva jooksul.

Kui teil tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, teavitage oma arsti.

Väga sage (võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st):

- peavalu;
- valutavad lihased;
- haiglane olek;
- väsimus;
- valu, punetus, paistetud, kõvenemine või sügelus süstekohas.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

- külmavärinad;
- palavik;
- liigeste valu, valu jäsemetes;
- isutus;
- sõlmed, värvimuutus, verevalumid või soojatunne süstekohas.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

- nina ja kurgu infektsioon, ülemiste hingamisteede infektsioon;
- paistetunud lümfisõlmed;
- häiritud uni;
- pearinglus, anomaalsed nahaaistingud;
- lihaskrambid;
- kurguvalu, nohu, köha;
- kõhulahtisus, oksendamine;
- lööve, sügelus, nahapõletik;
- veritsemine, ärritus;
- tursed kaenlaalustes, halb enesetunne, naha õhetus, valu rindkeres;
- südame laboratoorsete analüüside näitajate (nt troponiin I) suurenemine, maksaensüümide aktiivsuse tõus, vere valgeliblede arvu vähenemine, trombotsüütide arvu keskmine vähenemine.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

- põskkoopapõletik;
- gripp;
- konjunktiviit;
- nõgestõbi;
- naha värvimuutus;
- higistamine;
- verevalumid nahal;
- öine higistamine;
- nahaalused sõlmed;
- seljavalu;
- kaelavalu;
- lihaskrambid;
- lihasvalu;
- lihasnõrkus;
- pahklude, jalgade või sõrmede paistetud;
- südame kiirenenud löögisagedus;
- kõrva- ja kurguvalu;
- kõhuvalu;
- suukuivus;
- peapööritus (vertiigo);
- migreen;
- närvisüsteemi häire, mis põhjustab nõrkust, surinat või tundetust;
- uimasus;
- ketendus, põletik, anomaalsed nahaaistingud, reaktsioon süstekohas, lööve, tundetud, kuivus, liikuvuse piiratus või villid süstekohas;
- nõrkus;

- gripisarnane haigus;
- näo, suu ja kõriturse;
- vere valgeliblede arvu suurenemine;
- verevalumid.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas rõuge- ja ahvirõugevaktsiini säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Abiained

Abiained vt pakendilt.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2022.