

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

### Pakendi infoleht: teave kasutajale

**Vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasool**

**140mg+125mg+125mg**

**Tahke suukaudne ravimvorm**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasool ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtmist
3. Kuidas vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli säilitada
6. Muu teave

#### **1. Mis ravim on vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasool ja milleks seda kasutatakse**

Ravimit vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasool kasutatakse H. pylori infektsiooni raviks, kui varasem ravi ei ole olnud tulemuslik.

Ravimis sisaldub 3 toimeainet. Tetratsükliin ja metronidasool on antibiootikumid. Vismutsubtsitraat on vismuti soolavorm, mis omab samuti antibakteriaalset toimet.

Ravimit võetakse tavaliselt koos prootonpumba inhibiitoriga (näiteks omeprasool).

#### **2. Mida on vaja teada enne vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtmist**

**Vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli ei tohi kasutada, kui patsient :**

- on allergiline vismutsubtsitraadi, tetratsükliini, metronidasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- on rase või toidab last rinnaga
- on noorem kui 12-aastane
- põeb neeruhaiguseid
- põeb maksahaiguseid

#### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on plaanis röntgenuuring, sest ravim võib mõjutada uuringutulemust
- kui teil on plaanis vereanalüüs, sest ravim võib selle tulemust mõjutada
- kui teil on vereloome või kesknärvisüsteemi haiguseid
- kui teil on Cockayne'i sündroom

Ravim võib põhjustada fotosensitiivsust ehk ülitundlikkust päikesevalguse suhtes, mistõttu on ravi ajal soovitatav vältida kokkupuudet UV kiirgusega. Nahapunetuse või muude nahanähtude tekkel pidada nõu arstiga.

### **Lapsed ja noorukid**

Mitte kasutada seda ravimit alla 18-aastastel.

12-18- aastastel võib kasutada ainult juhul, kui muu ravi on vastunäidustatud või sobimatu.

### **Muud ravimid ja vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasool**

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooliga kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- Liitium – psühhiaatriliste haiguste raviks
- Ravimid, millega mõjutatakse vere hüübivust (näiteks varfariin)
- Fenütoiin ja fenobarbitaal - epilepsia
- Metoksüfluraan - anesteesiaaravim
- Teised antibiootikumid, eriti penitsilliin
- Toidulisandid, milles on rauda, tsinki või söögisoodat (naatriumbikarbonaat)
- Teisi ravimeid, milles on vismutit
- Busulfaan ja fluorouratsiil - kemoteeraapia
- Tsüklosporiin – keha immuunvastuse moduleerimine (näiteks siirdamise järgselt)
- Disulfiraam – alkoholismi ravi
- Ranitidiin – kõrvetiste ravi
- Retinoidid – nahahaiguste ravi
- Atovakvoon – malaaria ja teatud kopsuinfektsioonide ravi
- Amiodaroon – südame rütmihäirete ravi
- Digoksiin – südamepuudulikkuse ravi
- Rasestumisvastased preparaadid

Mitte kasutada alumiiniumi, kaltsiumi või magneesiumi sisaldavaid antatsiide antud ravimi tarvitamisega samal ajal.

**Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooliga.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

### **Vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga**

Võtta ravimit koos klaasitäie veega pärast toidukorda

Mitte tarvitada piimatooteid või jooke, millele on lisatud kaltsiumi, ravimi võtmise ajal.

### Alkohol

Ärge tarvitage alkoholi selle ravimi kasutamise ajal ega 3 päeva enne ravi alustamist, sest alkohol võib võimendada selle ravimi kõrvaltoimeid.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Ärge võtke ravimit, kui olete rase, plaanite rasedaks jääda ravi ajal või arvate, et olete rase. Kui rasestute ravi ajal, konsulteerige arstiga.

Ärge imetage ravimi tarvitamise ajal, sest ravim võib erituda rinnapiimaga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Ravim võib muuta teid uniseks, tekitada pearinglust ja nägemishäireid, seetõttu võib see ravim kahjustada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

### **3. Kuidas vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtta**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 3 kapslit 4 korda päevas (kokku 12 kapslit).

Võtke ravimit pärast söömist, kapsli peaks neelama alla tervelt klaasi veega, et vältida limaskesta ärritust.

Tavaliselt võetakse lisaks 2 korda 20mg päevas omeprasooli/esomeprasooli.

### **Kui te võtate vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli rohkem kui ette nähtud**

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

### **Kui te unustate vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtta**

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui vahele jääb rohkem kui 4 järjestikkust annust (1 ööpäev), pidage nõu arstiga.

### **Kui te lõpetate vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli võtmise**

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi tarvitamine ja võtke ühendust arstiga või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teil tekivad järgnevad sümptomid:

- Näo, huulte, keele või kõri turse, mis võivad põhjustada raskusi hingamisel või neelamisel
- Sügelev nõgeslööve (urtikaaria)

Tegemist võib olla allergilise reaktsiooniga ravimile.

vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasool võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Väga sagedased kõrvaltoimed (rohkem kui 1 patsiendil 10st):

- Väljaheite konsistentsi ja värvi muutused, seal hulgas tume väljaheide
- Kõhulahtisus
- Iiveldus
- Düsgeusia (näiteks metallimaitse suus)

Sagedased kõrvaltoimed (rohkem kui 1 patsiendil 100st):

- Kõhuvalu
- Kõhukinnisus
- Suukuivus
- Oksendamine
- Kõhugaasid
- Peavalu
- Nõrkustunne

- Väsimus
- Halb enesetunne
- Vaginaalne infektsioon
- Maksa transaminaaside tõus vereanalüüsis
- Tume uriin
- Söögiisu vähenemine
- Pearinglus
- Unisus
- Nahalööve
- Sügelus
- Anti anaboolne toime, jääklämmastiku tõus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1 patsiendil 1000st):

- Allergiline reaktsioon ravimile (sümptomiteks näiteks näo, huulte, keele, kõri turse, mis võib põhjustada raskusi hingamisel või neelamisel ja sügelev lööve)
- Kõhupuhitus
- Röhatused
- Haavandid suu limaskestal
- Keele värvuse muutus (tume keel)
- Keele turse
- Rindkerevalu
- Pärmseene infektsioonid suus või genitaalidel
- Naha tundlikkushäire (tuimus, sipelgate jooksmise tunne)
- Värinad
- Ärevus, depressioon või unehäired
- Mäluhäired
- Nahaprobleemid (sügelus, lööve)
- Udune nägemine
- Leukopeenia
- fototoksilisus

Harva esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1 patsiendil 10 000st)

- Trombotsütopeenia
- Hemolüütiline aneemia
- Hallutsinatsioonid ja mania
- Krambid
- Ataksia
- Pankreatiit
- ikterus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 patsiendil 10 000st)

- Anafülaktiline reaktsioon
- agranulotsütoos, aplastiline aneemia, neutropeenia
- entsefalopaatia ja subakuutne väikeaju sündroom
- koljusisese rõhu tõus, aju pseudotuumor
- hepatiit
- erütematoosse süsteemse luupuse ägenemine

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed:

- aseptiline meningiit
- pseudomembranoosne koliit
- Steven-Johnsoni sündroom (raske nahareaktsioon)

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasooli säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

## **6. Muu teave**

Abiained vt pakendilt.

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud augustis 2023**