

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fusidiinhape, 10mg/g, silmatilgad, suspensioon

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on fusidiinhape ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne fusidiinhappe kasutamist
3. Kuidas fusidiinhapet kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas fusidiinhapet säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on fusidiinhape ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine fusidiinhape toimib järgmistesse mikroorganismidesse: stafülokokid, streptokokid, neisseria, hemofiilus, moraksella ja korünebakter.

Fusidiinhappe silmatilku kasutatakse fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt tekitatud bakteriaalsete silmapõletike raviks, nt konjunktiviit, blefariit, odraiva, keratiit, dakrüotsüstiit ja ka seoses võõrkeha eemaldamisega silmast.

2. Mida on vaja teada enne fusidiinhappe kasutamist

Fusidiinhapet ei tohi kasutada,

- kui olete fusidiinhappe/fusidiinhappehemihüdraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge kasutage fusidiinhappe silmatilku liiga tihti, kuna bakteril võib tekkida resistentsus. Ärge kandke selle ravimi kasutamisel mingeid kontaktläätsi. Kontaktläätsi võib kasutada 12 tundi peale ravi lõpetamist.

Muud ravimid ja fusidiinhape

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid ei ole uuritud. Süsteemsed koostoimed ei ole tõenäolised, kuna süsteemsed toimed pärast fusidiinhappe silmatilkade manustamist on väheolulised.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Toimet rasedusele ei eeldata, sest fusidiinhappe silmatilkade süsteemne toime on ebaolulise tähtsusega. Fusidiinhappe silmatilku tohib kasutada raseduse ajal.

Imetamine

Rinnaga toidetaval vastsündinul/imikul ei eeldata toime ilmnemist, sest fusidiinhappe süsteemne toime imetavale naisele on ebaolulise tähtsusega. Fusidiinhappe silmatilku tohib kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fusidiinhappe silmatilgad ei mõjuta või mõjutavad ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet. Silmatilkade manustamise järgselt võib siiski tekkida hägusat nägemist, millega patsient peab arvestama.

3. Kuidas fusidiinhapet kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks tilk kaks korda ööpäevas. Tilgutage üks tilk ravimit kaks korda ööpäevas silma (üks hommikul, teine õhtul). Ravi tuleb jätkata vähemalt kahe päeva jooksul veel pärast seda kui silm on paranenud.

Kasutusjuhend

Enne fusidiinhappe silmatilkade manustamist peske alati käed.

1. Eemaldage tuubilt kork. Ärge kasutage, kui tuubi korki tihend on purunenud.
2. Fusidiinhappe silmatilkade manustamiseks seiske püsti või istuge mugavalt ja kallutage oma pead tahapoole. Hoidke tuubi silma kohal.
3. Tõmmake ettevaatlikult oma alumine silmalaug alla ja vajutage üks tilk tuubist oma alumisele silmalaule.
4. Jälgige, et tuubi ots ei puudutaks silma ega muud pinda, et vältida tuubi sisu saastumist.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kui see ravim on mõeldud lapsele, võite seda manustada lapsele magamise ajal või lamades, kui see on lihtsam.

Kui te kasutate fusidiinhapet rohkem, kui ette nähtud

Kui te manustate kogemata liiga palju ravimit silma(desse) või neelatakse väike kogus ravimit alla, ei ole tõenäoline, et see teeks kahju. Kui kogemata neelatakse suurem kogus ravimit alla või olete mures, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate fusidiinhapet kasutada

Kui te unustate oma ravimit kasutada, tehke seda niipea kui teile see meenub. Seejärel kasutage oma ravimit tavalisel ajal. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate fusidiinhappe kasutamise

Järgige arsti nõuandeid ravi kestuse kohta.

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Fusidiinhape võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Rasked kõrvaltoimed on järgmised.

- Hingamisraskused, lööve, silmalaugude, näo või huulte sügelus või turse. Kui märkate ükskõik millist ülaltoodud toimetest, võtke viivitamatult ühendust oma arsti või meditsiiniõega, kuna need võivad olla allergilise reaktsiooni (ülitundlikkus) nähud.
- Turse punase lööbega nahapinna all või sügelevad, kõrgenenud, punased või nahavärvi vorbid (angioödeem või urtikaaria).

Sage: võib esineda kuni ühel inimesel 10-st

- hägune nägemine (mööduv)
- valu manustamiskohal (sealhulgas põletus- ja kipitustunne silmas);
- sügelus manustamiskohas
- ebamugavustunne/ ärritus manustamiskohal

Aeg-ajalt: võib esineda kuni ühel inimesel 100-st

- silmalau turse (ödeem)
- vesised silmad (pisaraerituse suurenemine)
- nahalööve

Harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st

- silma limaskesta põletiku (konjunktiviit) ägenemine

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.raviamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas fusidiinhapet säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2023.