

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale Klindamütsiin, 10mg/ml, nahalahus

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist
3. Kuidas klindamütsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas klindamütsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse

Klindamütsiini paikset lahust kasutatakse akne, mädavilltõve (impetiigo) raviks. Klindamütsiin on näidustatud ka mädase higinäärme põletiku e hidradeniidi raviks.

2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist

Klindamütsiini ei tohi kasutada

- kui olete klindamütsiini või linkomütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne klindamütsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Klindamütsiini paikset lahust tuleb ettevaatusega määrata atoopilistele isikutele ja neile, kellel on anamneesis seedetrakti haigused (Crohni tõbi, haavandiline koliit).

Suukaudset või parenteraalset klindamütsiini, nagu enamikku antibiootikume, on seostatud raske kõhulahtisuse ja pseudomembranoosse koliidiga. Kuigi neid kõrvaltoimeid on esinenud harva klindamütsiini paiksel manustamisel, kõhulahtisuse või koliidi korral peaksite konsulteerima oma arstiga. Kui kõhulahtisus on selle ajal püsiv ja raske, tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Lapsed

Ohutus ja efektiivsus alla 12-aastastel lastel ei ole tõestatud.

Muud ravimid ja klindamütsiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

- kui te tarvitate linkomütsiini. Klindamütsiini ja linkomütsiini vahel on näidatud ristresistentsust;

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos klindamütsiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Klindamütsiini kasutamise ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud. Klindamütsiini ei tohi kasutada raseduse või imetamise ajal.

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainetega kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

Klindamütsiini paikne lahus sisaldab alkoholset alust, mis võib põhjustada silmade kipitust ja ärritust. Juhuslikul kokkupuutel tundlike piirkondadega (silmad, limaskestad) pesta rohkelt külma vett.

3. Kuidas klindamütsiini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Annustamine

Kandke kahjustatud alale kerge kiht lahust kaks korda ööpäevas.

Kui te kasutate klindamütsiini rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise juhtumeid ei ole kirjeldatud.

Kui klindamütsiini lokaalne lahus satub silma ja/või limaskestadele, pesta kohe rohke jaheda veega.

Üleannustamise või juhusliku allaneelamise korral konsulteerige mürgistusteabe keskusega ja rakendage sümptomaatilist ravi, alati arsti järelevalve all.

Kui te unustate klindamütsiini kasutada

Kui te unustate annuse manustada, siis tehke see niipea, kui see teile meenub.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate klindamütsiini kasutamise

On oluline, et te kasutataksite klindamütsiini nii, nagu arst on teile määranud, välja arvatud juhul, kui arst palub teil ravi lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui te märkate ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest:

Kõige tavalisem kõrvaltoime on naha kuivus. Paiksete preparaatidega ravitud patsientidel on kirjeldatud kõhulahtisuse juhtumeid, sh verist ja koliiti (sealhulgas pseudomembranoosne koliit). Muud toimed, mida on kirjeldatud klindamütsiini paiksete ravimvormide kasutamise tulemusena on:

Kohalikud mõjud: kontaktdermatiit, ärritus (erüteem, koorumine, põletustunne), rasune nahk, gramnegatiivne follikuliit.

Süsteemsed mõjud: kõhuvalu, ebamugavustunne seedetraktis.

Kui teil esineb allergiline reaktsioon, pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas klindamütsiini säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Abiained

Abiained vt pakendilt.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2024.