

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

lidokaiin + tsetrimiid
50 mg + 1,5 mg/g igemegeel

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on lidokaiin/tsetrimiid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne lidokaiin/tsetrimiidi kasutamist
3. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on lidokaiin/tsetrimiid ja milleks seda kasutatakse

Lidokaiin/tsetrimiid igemegeel on kombinatsioonpreparaat, mille toimeaineteks on lidokaiin ja tsetrimiid, mida kasutatakse hambaravis lokaalanesteetikumina (paikne tuimasti).

Seda kasutatakse suulimaskesta paikseks tuimastuseks enne infiltratsioonanaesteesiat, hambakroonide ja -sildade proovimist ning korrigeerimist, hambakivi eemaldamist ja hamba väljatõmbamist.

Patsienti peab informeerima, et paikse tuimastuse tõttu on oht hammustada kogemata eelnevalt tuimastatud huulde, põske ja/või keelde.

2. Mida on vaja teada enne lidokaiin/tsetrimiidi kasutamist

Lidokaiin/tsetrimiidi ei tohi kasutada,

- kui olete allergiline lidokaiini ja/või tsetrimiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes;
- alla 4-aastastel lastel;
- süstimiseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne lidokaiin/tsetrimiidi kasutamist pidage nõu oma hambaarstiga.

Kui suhu satub rohkem geeli kui vaja, tuleb üleliigne välja sülitada, et vältida selle allaneelamist ning liigset imendumist.

Suu limaskestast vigastuse korral tuleb olla ettevaatlik, sest lidokaiini imendumine võib toimuda kiiremini ja ulatuslikumalt.

Sportlased

Ravim sisaldab toimeainet lidokaiin, mis võib suure tõenäosusega anda dopingutestis positiivse tulemuse.

Muud ravimid ja lidokaiin/tsetrimiid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Lidokaiini teadaolevate koostoimete (nt beetablokaatorid, antiarütmikumid) esinemine on vähetõenäoline, kui lidokaiini kasutatakse paikseks manustamiseks suulimaskestale.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Lidokaiin/tsetrimiidi ei soovitata raseduse ja imetamise ajal kasutada.

3. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult paikseks kasutamiseks. Manustatakse gingivaalselt (igemele).

Korraga võib manustada 0,10 g kuni 0,20 g geeli (vastab 5 mg kuni 10 mg lidokaiinile). Ööpäevane maksimaalne annus ei tohi ületada 4 g 5% lidokaiinisisaldusega geeli (vastab 200 mg lidokaiinile). Igemegeel kantakse eelnevalt kuivatatud limaskestale vatitiku, spaatli või suuõõne jaoks sobiva lühikese pulga abil.

Pärast igemegeeli limaskestale kandmist on oluline üleliigne geel välja sülitada. Igemegeeli ei tohi alla neelata.

Kui teile manustatakse lidokaiin/tsetrimiidi rohkem, kui ette nähtud

Igemegeeli kasutamisel hambaravis, ei ole üleannustamisest teatatud.

Juhul kui teile manustatakse igemegeeli soovitatust suurem annus, võivad tekkida toksilisuse kardiovaskulaarsed või neuroloogilised nähud (vt lõik 4 "Võimalikud kõrvaltoimed"). Üleannustamise korral tuleb kohe pöörduda lähimasse haiglasse.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma hambaarstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka lidokaiin/tsetrimiid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Tekkida võivad toksilised reaktsioonid, eelkõige lokaalanestetikumi üleannustamisest (kas juhuslik veeni süstimine või lokaalselt liiga suure annuse manustamine), mille kliinilised sümptomid võivad olla järgmised:

Kesknärvisüsteem: närvilisus, rahutus, haigutamine, värinad, kartlikkus, silmatõmblus, logorröa, peavalu, iiveldus, helin kõrvades (tinnitus).

Respiratoorne süsteem: tahhüpnöe, seejärel düspnoe, millele võib järgneda apnoe.

Kardiovaskulaarne süsteem: tahhükardia, hüpertensioon, millele tõenäoliselt järgnevad hüpotensioon, bradükardia, mis võib viia südameseiskuseni.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale – Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt.

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2024.