

PAKENDI INFOLEHT
Dobutamiin, 12,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

Toimeaine:

Dobutamiin 12,5 mg

2. LOOMALIIGID

Koer.

3. NÄIDUSTUS(ED)

Hüpotensiooni korrigeerimine anesteesia ajal.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Vältida patsientidel, kellel on südame väljavoolu takistus, nt aordiklapi stenoos.

5. KÕRVALTOIMED

Esineda võib iiveldust, oksendamist ja krampe.

Tahhükardia, proarrütmia, hüpertensioon, mida saab korrigeerida infusiooni lõpetamisega kuna dobutamiin on lühikese toimeajaga.

Pikemaajalisel kasutamisel võib tekkida hüpokaleemia.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, teavitage palun sellest www.ravimiamet.ee kaudu.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intravenoosne manustamine.

2,5-20 mikrogrammi 1 kg kehamassi kohta minutis püsiinfusioonina. Alustada kõige madalamast annusest ja tõsta seda kuni saabub soovitud toime.

Kõrvaltoimeid on täheldatud üle 10 mikrogramm/kg/min annuste manustamisel.

7. KEELUAEG

Ei rakendata.

8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

9. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ventrikulaarse tahhüarütmia või fibrillatsiooniga loomadel kasutada suure ettevaatusega.

Hüповoleemia tuleks korrigeerida enne dobutamiini manustamist, vastasel juhul võib müokardi hapnikunõudlus suureneja ja see võib tõsta infarkti kahjustuse suurust.

Diabeediga loomadel võib kasvada insuliinivajadus.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vaskulaarne resistentsus võib suureneja kui dobutamiiniga koos kasutatakse beeta-blokeerivaid aineid, nt propranolool, doksapraam või monoamiini oksidaasi inhibiitorid. Halotaaniga samaaegne kasutamine võib suurendada arütmia juhtumeid.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Tahhükardia, kõrgeenenud vererõhk, närvilisus, uimasus. Kuna ravim on lühikese toimeajaga, siis piisab ravi ajutisest peatamisest, et nähud leeveneksid.

10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2021

12. LISAINFO

Müügilooma ravim