

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Kolhitsiin, 0,5mg või 0,6mg, tahke suukaudne ravimvorm

Ravimit turustatakse Eesti Vabariigis Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on kolhitsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne kolhitsiini võtmist
3. Kuidas kolhitsiini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas kolhitsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on kolhitsiin ja milleks seda kasutatakse

Kolhitsiin kuulub podagravastaste ravimite hulka ja seda kasutatakse podagra korral. Kolhitsiin pärsib podagra põletikulist protsessi.

Kolhitsiini kasutatakse ka teatud südamehaiguste korral, nt südamepauna haaravad haigusseisundid ja ägeda reuma järgselt tekkinud südamekahjustuse korral.

Kolhitsiini võidakse kasutada ka muude sidekoehaiguste korral.

2. Mida on vaja teada enne kolhitsiini võtmist

Kolhitsiini ei tohi võtta:

- kui olete kolhitsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline (loetletud pakendil);
- kui teil on raske vereloomehäire;
- kui te olete rase;
- kui te toidate last rinnaga;
- kui te olete fertiilses eas naine ja ei kasuta efektiivset kontratseptsiooni;
- kui teil on raske maksa- või neeruhaigus;
- kui te saate hemodialüüsi;
- koos teatud ravimitega (vt lõik Muud ravimid ja kolhitsiin).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne kolhitsiini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on probleeme südame, neerude, maksa või seedeelundkonnaga;
- kui te olete eakas ja nõrgas seisundis;
- kui teil on vereloomehäired.

Kuna kolhitsiin on väga väikese terapeutilise vahemikuga ravim (st erinevus raviks vajaliku toimiva annuse ja toksilise annuse vahel on väga väike) ja suurtes annustes toksiline, siis peavad kolhitsiini kasutajad olema eriliselt tähelepanelikud, et nad ei ületaks neile raviks määratud ööpäevast annust. Kui teil tekivad üleannustamisega seotud sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja/või kõhulahtisus, siis lõpetage ravimi tarvitamine koheselt ja võtke ühendust oma arstiga.

Kolhitsiin mõjutab luuüdi, põhjustades teatud valgete vererakkude (granulotsüütide) ja punaste vererakkude (erütrotsüütide) ja trombotsüütide arvu langust. Seetõttu tuleks ravi ajal kolhitsiiniga teha teile regulaarselt vereanalüüse. Kui teil tekivad sellised sümptomid nagu palavik, põletik suus, kurguvalu, verevalumid tavalisest kergemini, aeglasem verehüübimine, siis lõpetage selle ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole. Need sümptomid võivad olla tõsise vereloome häire tunnusteks.

Muud ravimid ja kolhitsiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teatage oma arstile kindlasti, kui kasutate mõnda järgnevatest ravimitest, sest nende ravimite kasutamisel koos kolhitsiiniga tuleb nende annuseid kohandada. Kui teil esineb aga maksa või neeruhaigus ja te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest, siis ei tohi te samaaegselt kolhitsiini võtta. Nendeks ravimiteks on:

- Teatud antibiootikumid, nagu klaritromütsiin, erütromütsiin, telitromütsiin.
- Teatud viirusevastased ravimid, nagu ritonavir, atasanavir, indinavir (kasutatakse HIV infektsiooni korral).
- Tsüklosporiin (kasutatakse äratõukereaktsiooni ennetamiseks organi siirdamise järgselt, psoriaasi ja reumatoidartriidi korral).
- Teatud seeninfektsiooni korral kasutatavad ravimid, nagu ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool.
- Teatud südameravimid, nagu verapamiil ja diltiaseem.
- Disulfiraam (kasutatakse alkoholismi korral).

Eriiline ettevaatus on vajalik ka siis, kui kolhitsiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- Tsimetidiin (kasutatakse mao ülihappesuse korral), sest see võib suurendada kolhitsiini sisaldust veres.
- Tolbutamiid (kasutatakse veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks), sest see võib suurendada kolhitsiini sisaldust organismis.
- Digoksiin (kasutatakse teatud südamehaiguste korral) ja fibraadid (kasutatakse vere kolestrooli taseme langetamiseks), sest need ravimid suurendavad koos kolhitsiiniga kasutades lihaskahjustuse riski.
- Tsüklosporiin ja statiinid (kasutatakse vere kolesteroolitaseme langetamiseks), sest need ravimid suurendavad koos kolhitsiiniga kasutatult riski lihaskahjustuse tekkimiseks.

Samuti peab olema ettevaatlik kolhitsiini kasutamisel samaaegselt ravimitega, mis teadaolevalt kahjustab maksa, neerusid või vereloomet.

Kolhitsiin võib langetada vitamiin B12 sisaldust veres.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos kolhitsiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Kolhitsiini võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Greip võib suurendada kolhitsiini sisaldust veres. Seetõttu ei tohi süüa greipi ega juua greibimahla ajal, mil saate ravi kolhitsiiniga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, siis ei tohi te seda ravimit kasutada. Kolhitsiin imendub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, siis ei tohi te seda ravimit kasutada. Kui te olete fertiilses eas naine, siis peate samaaegselt kolhitsiiniga kasutama efektiivset kontratseptsiooni.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kolhitsiin võib põhjustada uimasust ja pearinglust. Te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega, kui teil esinevad kolhitsiini kasutamise järgselt sellised sümptomid.

3. Kuidas kolhitsiini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst ütleb teile, kui palju ja kui sageli te peate seda ravimit võtma.

Eakad ja kaasuvate haigustega patsiendid:

Eakate ja kaasuvate haigustega, eriti kroonilise neeruhaigusega patsientidele määrab arst tavapärasest väiksema annuse.

Kui te võtate kolhitsiini rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise esimesteks nähtudeks on seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate kolhitsiini võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad kolhitsiini kasutamise ajal järgmised kõrvaltoimed, siis lõpetage selle ravimi kasutamine ja pöörduge koheselt arsti poole:

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus. Veri väljaheites.

Kurguvalu, põletik suus.

Verevalumite teke tavalisest kergemini. Tavalisest aeglasem verehüübimine.

Väga tugev kõhuvalu.

Urineerimisraskused.

Kolhitsiin võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:

- Lihasnõrkus, lihaste kõhetumine, lihaskrambid
- Juuste välja langemine
- Nahalööve

- Maksa kahjustus
- Veritsus seedetraktist
- Neerukahjustus, mis tuleneb lihaste lagunemisest tekkivate ainete kuhjumise tõttu (rabdomüolüüs)
- Vereloomehäired
- Spermatogeneesi häired, sh väheste spermide hulk spermas
- Menstruatsiooni häired, sh valulik menstruatsioon, menstruatsiooni vahele jäämine

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas kolhitsiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2023.