

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

**Pakendi infoleht: teave kasutajale
Tobramütsiin, 3 mg/ml, silmatilgad**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on tobramütsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne tobramütsiini kasutamist
3. Kuidas tobramütsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas tobramütsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on tobramütsiin ja milleks seda kasutatakse

Tobramütsiinile tundlike bakterite poolt põhjustatud silma ja silmamanuste väliste infektsioonide ravi täiskasvanutel ning 1-aastastel ja vanematel lastel.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

2. Mida on vaja teada enne tobramütsiini kasutamist

Tobramütsiini ei tohi kasutada

- kui olete tobramütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti või apteekriga enne tobramütsiini kasutamist:

- Tobramütsiini kasutatakse silmas. Seda ei tohi süstida või alla neelata;
- kui teil esineb maksa- või neeruhaigus;
- kui teil tekib tobramütsiini kasutamisel allergiline reaktsioon, katkestage ravimi kasutamine ja pidage nõu oma arstiga. Allergilised reaktsioonid võivad olla erinevad, alates paiksest sügelusest või nahapunetusest kuni raskete allergiliste reaktsioonide (anafülaktiline reaktsioon) või tõsiste nahareaktsioonideni. Need allergilised reaktsioonid võivad esineda ka teiste paiksetelt või süsteemselt kasutatavate sama rühma antibiootikumide (aminoglükosiidide) suhtes;
- kui te kasutate tobramütsiini ravi ajal mis tahes teisi antibiootikume, pidage nõu oma arstiga;
- kui teie sümptomid halvenevad või ilmnevad taas, pidage nõu oma arstiga. Kui te kasutate tobramütsiini pikema aja jooksul, võite olla vastuvõtlikum silmainfektsioonidele;
- kui te kannate kontaktläätsi;
- kontaktläätsede (kõvade või pehmete) kandmine ei ole silmainfektsiooni ravi ajal soovitatav;

- kui te sellele vaatamata kannate kontaktläätsi, tuleks need enne tobramütsiini kasutamist eemaldada ning oodata 15 minutit, enne kui te need tagasi panete;
- kui te kasutate teisi ravimeid. Palun lugege osa „Muud ravimid ja tobramütsiin“;
- kui teil on diagnoositud või kahtlustatakse rasket müasteeniat või Parkinsoni tõbe. Seda tüüpi antibiootikumid võivad süvendada lihasnõrkust.

Muud ravimid ja tobramütsiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Tobramütsiini kasutamine koos teiste ravimitega võib põhjustada kõrvaltoimete ägedust.

Antibiootikumi (aminoglükosiid) ja teiste süsteemsete, suukaudsete, paiksete ravimite kasutamine võib kahjustada närvisüsteemi, kõrvu või neere.

Steroidsalvide kasutamine võib peita mis tahes nakkuste kliinilisi sümptomeid ja pärssida allergilisi reaktsioone.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Tobramütsiini tohib raseduse ajal kasutada üksnes selge vajaduse korral. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Tobramütsiini ei ole soovitatav kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast tobramütsiini tilgutamist häiritud. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega, kuni see on möödunud.

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainetega kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

Tobrex sisaldab boorhapet, mis võib kahjustada tulevast viljakust. Seetõttu ei tohi:

- alla 2-aastastele lastele manustada rohkem kui 14 silmatilka päevas,
- alla 12-aastastele lastele manustada rohkem kui 46 silmatilka päevas.

3. Kuidas tobramütsiini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Arst ütleb teile, kui kaua tuleb ravimit kasutada. Ärge lõpetage ravi järsku, isegi kui seisund on paranenud.

Ainult silma manustamiseks.

Teismelised ja täiskasvanud, sealhulgas eakad patsiendid

Kerge kuni mõõduka haiguse korral on annuseks tobramütsiini silmatilku üks või kaks tilka haige silma konjunktivaalkotti iga nelja tunni järel.

Rasketel juhtudel on annuseks tobramütsiini silmatilku üks või kaks tilka haige silma konjunktivaalkotti üks kord tunnis kuni paranemiseni, seejärel vähendatakse annust järk-järgult enne ravimi kasutamise katkestamist. Ärge lõpetage ravi järsku.

Nagu kõigi teiste antibakteriaalsete ainete puhul, tuleb ravi ajal hinnata bakterite tundlikkust.

Tavaliselt on kasutusaeg 7-10 päeva.

Pärast ravimi kasutamist on soovitatav silmalaugu kergelt vajutada. Sellega saab vältida ravimi süsteemset imendumist, vähendades seeläbi süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust.

Kui samaaegselt kasutatakse teisi paikseid silmaravimeid, tuleb ravimite manustamise vahele jätta vähemalt 5 minutit. Silmasalve tuleks manustada viimasena.

Lapsed

Lastele alates 1. eluaastast võib tobramütsiini silmatilku kasutada täiskasvanutega samas annuses. Kuna Tobrex sisaldab boori, on maksimaalne lubatud kumulatiivne annus mõlemasse silma alla 2-aastastel lastel 14 silmatilka päevas ja 2- kuni 12-aastastel lastel 46 silmatilka päevas. Ohutus ja efektiivsus alla 1-aastastel lastel ei ole tõestatud ja andmed puuduvad.

Maksa- ja neerufunktsiooni häiretega patsiendid

Nendes patsientide populatsioonides ei ole tobramütsiiniga uuringuid läbi viidud, kuid tobramütsiini vähese süsteemse imendumise tõttu pärast paikset manustamist ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kuidas tobramütsiini silmatilku manustada

Kasutage tobramütsiini silmatilku ainult silma(de)sse tilgutamiseks.

1. Võtke tobramütsiini silmatilkade pudel ja peegel.
2. Peske oma käed.
3. Avage pudel. Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.
4. Hoidke pudelit suunaga allapoole põidla ja keskmise sõrme vahel.
5. Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalau eemale, kuni tekib 'tasku', kuhu tuleb ravimit tilgutada.
6. Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit, kui vajalik.
7. Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu ega teisi ümbritsevaid piirkondi. Lahu võib saastuda.
8. Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga tobramütsiini silmatilku korraga.
9. Pärast tobramütsiini silmatilkade tilgutamist sulgege silm ja vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk. See aitab vältida tobramütsiini silmatilkade süsteemset imendumist.
10. Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid.
11. Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (1 kuni 10 kasutajal 100-st):

- ebamugavustunne silmas;
- silma punetus.

Aeg-ajalt (1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

- silma pindmine põletik;
- sarvkesta kahjustus;
- nägemise halvenemine;
- hägune nägemine;
- silmalau punetus;
- silma ja silmalau turse;
- valu silmas;
- kuivsilmsus;

- eritis silmast;
- sügelus silmas;
- suurenenud pisaravool;
- allergia (ülitundlikkus);
- peavalu;
- nõgestõbi;
- nahapõletik;
- ripsmete väljalangemine või kasvu pidurdumine;
- naha pigmentatsiooni kadumine;
- sügelus ja kuiv nahk.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- silma allergia;
- silmaärritus;
- silmalau sügelus;
- raske allergiline reaktsioon;
- tõsised nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem).

Kui kõrvaltoimed on kergemat laadi, on ravi jätkamine tavaliselt lubatud. Kahtluse korral pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas tobramütsiini säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt.

6. Muu teave

Abiained

vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2024.