

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale Lamotrigiin, 100 mg tahke suukaudne ravimvorm

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on lamotrigiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne lamotrigiini võtmist
3. Kuidas lamotrigiini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas lamotrigiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on lamotrigiin ja milleks seda kasutatakse

Lamotrigiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse *epilepsiavastasteks ravimiteks*. Seda kasutatakse kahe haiguse – **epilepsia** ja **bipolaarse häire** – raviks.

Lamotrigiin ravib epilepsiat, blokeerides epilepsiahoogusid (krampe) vallandavad signaalid ajus.

- Täiskasvanutel ja lastel alates 13. eluaastast võib Lamotrigiini kasutada eraldi või koos teiste ravimitega epilepsia raviks. Lamotrigiini võib koos teiste ravimitega kasutada ka Lennox-Gastaut' sündroomiks nimetatud haigusseisundiga seotud krampide raviks.
- 2...12-aastastel lastel võib lamotrigiini kasutada koos teiste ravimitega nimetatud haiguste raviks. Ravimit võib kasutada eraldi sellist tüüpi epilepsia raviks, mida nimetatakse tüüpilisteks absansideks.

Lamotrigiin ravib ka bipolaarset häiret.

Bipolaarse häirega (mõnikord nimetatakse ka *maniakaal-depressiivseks häireks*) inimestel esinevad väljendunud meeleolu kõikumised, kus mania (erutuse või eufooria) perioodid vahelduvad depressiooni (sügava kurbuse või meeleheite) perioodidega. Täiskasvanutel alates 18. eluaastast võib Lamotrigiini kasutada eraldi või koos teiste ravimitega, et vältida bipolaarse häire korral esinevate depressiooni perioodide teket. Veel ei ole teada, kuidas toimib Lamotrigiin ajus selle toime saavutamiseks.

2. Mida on vaja teada enne lamotrigiini võtmist

Lamotrigiini ei tohi võtta

- **kui olete** lamotrigiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes **allergiline (ülitundlik)**.

Kui see kehtib teie kohta:

- ➔ **Informeerige oma arsti** ning ärge lamotrigiini võtke.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga lamotrigiin

Enne Lamotrigiini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- **kui teil on ükskõik milliseid probleeme neerudega;**
- **kui teil on kunagi tekkinud nahalööve** pärast lamotrigiini või teiste bipolaarse häire või epilepsia ravimite võtmist;
- **kui teil tekib lööve või päikesepõletus pärast lamotrigiini võtmist ja otseses päikese- või tehisvalguses viibimist (nt solaariumis).** Teie arst kontrollib teie ravi ning võib soovitada teil vältida otsest päikesevalgust või end selle eest kaitsta (nt kasutada päikesekreemi ja/või kanda kaitsvaid rõivaid);
- **kui teil on kunagi pärast lamotrigiini võtmist tekkinud meningiit** (*nende sümptomite kirjeldust lugege käesoleva infolehe lõigust 4: „Harva esinevad kõrvaltoimed“*);
- **kui te juba võtate lamotrigiini sisaldavat ravimit;**
- **kui teil esineb haigusseisund, mille nimi on Brugada sündroom, või mõni muu probleem südamega.** Brugada sündroom on geneetiline haigus, mis põhjustab südame ebanormaalset elektrilist aktiivsust. Lamotrigiin võib vallandada EKG-s kõrvalkaldeid, mis võivad põhjustada arütmiaid (ebanormaalne südamerütm).

Kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta:

- ➔ **Informeerige oma arsti,** kes võib otsustada, et on vaja vähendada annust või et Lamotrigiin ei ole teile sobiv ravim.

Oluline teave potentsiaalselt eluohtlike reaktsioonide suhtes

Väikesel arvul Lamotrigiini võtvatest inimestest tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt eluohtlik nahareaktsioon, mis ravita jätmisel võib areneda tõsisemateks probleemideks. Need võivad olla Stevensi–Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermise nekrolüüs (TEN) ja reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (ingl. keeles *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms*, DRESS). Te peate teadma, milliste sümptomite suhtes Lamotrigiini võtmise ajal valvel olla.

- ➔ **Lugege nende sümptomite kirjeldust käesoleva infolehe punktis 4 „Potentsiaalselt eluohtlikud reaktsioonid: te vajate kohest arstiabi“** alt.

Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH)

Lamotrigiini kasutataval patsientidel on teateid harvaesinevast, kuid väga tõsisest immuunsüsteemi reaktsioonist.

- ➔ **Pöörduge kohe oma arsti või apteekri poole,** kui teil esineb lamotrigiini kasutamise ajal ükskõik milline järgmistest sümptomitest: palavik, lööve, neuroloogilised sümptomid (nt vappumine või värisemine, segasusseisund, ajufunktsiooni häired).

Enesevigastamise või enesetapumõtted

Epilepsiaavastaseid ravimeid kasutatakse mitmete seisundite, sealhulgas epilepsia ja bipolaarse häire raviks. Bipolaarse häirega inimestel võivad mõnikord tekkida enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil on bipolaarne häire, võivad need mõtted suurema tõenäosusega tekkida:

- ravi alustamisel,
- kui teil on varem esinenud enesevigastamise või enesetapumõtteid,
- kui te olete alla 25-aastane.

Kui teil esinevad piinavad mõtted ja tunded või kui te märkate, et te tunnete ennast Lamotrigiini võtmise ajal halvemini või teil tekivad uued sümptomid:

- ➔ **Pöörduge abi saamiseks niipea kui võimalik arsti poole või lähimasse haiglasse.**

Abiks võib olla see, kui ütlete pereliikmele, hooldajale või lähedasele sõbrale, et teil võib tekkida depressioon või märkimisväärne meeleolu muutus ja palute neil läbi lugeda käesoleva infolehe. Võite paluda, et nad ütleksid teile, kui nad on mures teie depressiooni või muude käitumise muutuste pärast.

Vähestel epilepsiavastaseid ravimeid (nagu näiteks Lamotrigiini) kasutanud inimestel on tekkinud enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil mingil ajal peaksid sellised mõtted tekkima, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui te võtate lamotrigiini epilepsia raviks

Mõnede epilepsia vormide korral esinevad krambid võivad mõnikord Lamotrigiini võtmise ajal halveneda või tekkida sagedamini. Mõnel patsiendil võivad tekkida raskekujulised krambid, mis võivad põhjustada tõsisemaid terviseprobleeme. Kui krampe esineb sagedamini või kui teil tekib Lamotrigiini võtmise ajal raskekujuline krambihoog:

→ **Pöörduge niipea kui võimalik arsti poole.**

Bipolaarse häire raviks ei tohi lamotrigiini kasutada alla 18-aastastel inimestel. Depressiooni ja teiste vaimse tervise probleemide raviks mõeldud ravimid suurendavad riski enesetapumõtete ja suitsidaalse käitumise tekkeks alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja lamotrigiini

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimseid preparaate või ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teie arst peab teadma, kui te võtate muid ravimeid epilepsia või vaimse tervise probleemide raviks. See on vajalik Lamotrigiini õige annuse määramiseks. Nende ravimite hulka kuuluvad:

- **okskarbbasepiin, felbamaat, gabapentiin, levetiratsetaam, pregabaliin, topiramaat või zonisamiid**, mida kasutatakse **epilepsia** raviks;
- **liitium, olansapiin või aripiprasool**, mida kasutatakse **vaimse tervise probleemide** raviks;
- **bupropioon**, mida kasutatakse **vaimse tervise probleemide** raviks või abivahendina **suitsetamisest loobumisel**;
- **paratsetamool**, mida kasutatakse **valu ja palaviku** raviks.

→ **Informeerige oma arsti**, kui te võtate mõnda neist ravimitest.

Mõnedel ravimitel on koostoimeid lamotrigiiniga või nende toimel tekivad patsientidel suurema tõenäosusega kõrvaltoimed. Nendeks ravimiteks on:

- **valproaat**, mida kasutatakse **epilepsia** ja **vaimse tervise probleemide** raviks;
 - **karbamasepiin**, mida kasutatakse **epilepsia** ja **vaimse tervise probleemide** raviks;
 - **fenütoiin, primidoon või fenobarbitaal**, mida kasutatakse **epilepsia** raviks;
 - **risperidoon**, mida kasutatakse **vaimse tervise probleemide** raviks;
 - **rifampitsiin**, mis on **antibiootikum**;
 - ravimid, mida kasutatakse **inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) nakkuse** raviks (lopinaviiri ja ritonaviiri või atasanaviiri ja ritonaviiri kombinatsioon);
 - **hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid**, nt **antibeebipillid** (*vt allpool*).
- **Informeerige oma arsti**, kui te võtate ükskõik millist neist ravimitest või alustate või lõpetate nende võtmist.

Hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid (nt antibeebipillid) võivad mõjutada lamotrigiini toimet

Arst võib soovitada, et te kasutaksite mingit kindlat tüüpi hormonaalset rasestumisvastast meetodit või mõnda teist rasestumisvastast meetodit (nt kondoomid, diafragma või spiraal). Kui te võtate hormonaalset rasestumisvastast preparaati, nagu antibeebipillid, võib arst võtta vereproovid lamotrigiini sisalduse kontrollimiseks. Kui te kasutate või plaanite kasutada hormonaalset rasestumisvastast preparaati:

→ **Informeerige oma arsti**, kes arutab teiega sobivaid rasestumisvastaseid meetodeid.

Lamotrigiini võib samuti mõjutada hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide toimet, kuigi ei ole tõenäoline, et nende toimivus väheneks. Kui te kasutate hormonaalset rasestumisvastast preparaati ning märkate menstruaaltsükli muutusi, näiteks veritsust või määrimist menstruatsioonide vahepeal:

→ **Rääkige oma arstiga.** Need ilmingud võivad viidata sellele, et Lamotrigiini mõjutab rasestumisvastase preparaadi toimet.

Rasedus ja imetamine

→ **Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.**

- **Ilma arsti teadmista ei tohi ravi lõpetada.** Eriti oluline on see juhul, kui teil on epilepsia.
- Rasedus võib muuta Lamotrigiini toimivust, mistõttu võib osutuda vajalikuks vereanalüüside andmine ja Lamotrigiini annuse vastav reguleerimine.
- Kui lamotrigiini kasutatakse raseduse 3 esimese kuu ajal, on pisut suurenenud risk sünnidefektide tekkeks, sh huule- või suulaelõhed.
- Arst võib teile soovitada, et võtaksite raseduse planeerimise ja raseduse ajal lisaks foolhappe preparaati.

→ **Kui te imetate või kavatsete imetada, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.** Lamotrigiinis sisalduv toimeaine eritub rinnapiima ja võib mõjutada teie last. Arst arutab teiega lamotrigiini võtmise ajal rinnaga toitmise saadavat kasu ja sellega seotud riske ning kui te otsustate rinnaga toita, kontrollib arst aeg-ajalt teie last uimasuse, lööbe või kehva kaalu suhtes. Teavitage oma arsti, kui täheldate imikul ükskõik millist nimetatud sümptomit.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lamotrigiin võib põhjustada peeringlust ja kahelinägemist.

→ **Ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui te olete kindel, et teil ei esine neid kõrvaltoimeid.**

Kui teil on epilepsia, arutage oma arstiga autojuhtimise ja masinatega töötamisega seotud küsimusi.

3. Kuidas Lamotrigiini võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju lamotrigiini võtta

Lamotrigiini sobivaima annuse leidmine võib võtta aega. Teie annus sõltub järgnevast:

- teie vanusest,
- kas te võtate Lamotrigiini koos teiste ravimitega,
- kas teil esineb ükskõik milliseid neeru- või maksatalitluse häireid.

Teie arst kirjutab teile alustuseks väikese annuse ja suurendab annust järk-järgult mõne nädala jooksul kuni toimiva annuse saavutamiseni (seda nimetatakse *efektiivseks annuseks*). **Ärge kunagi võtke rohkem lamotrigiini, kui teie arst on määranud.**

Lamotrigiini tavaline efektiivne annus täiskasvanutele ja üle 13-aastastele lastele on 100...400 mg päevas.

2...12-aastastel lastel sõltub efektiivne annus kehakaalust – tavaliselt jääb see vahemikku 1...15 mg kilogrammi lapse kehakaalu kohta, maksimaalne säilitusannus 200 mg ööpäevas.

Lamotrigiini ei soovitata alla 2-aastastele lastele.

Kuidas lamotrigiini annust võtta

Võtke lamotrigiini annus üks või kaks korda päevas, nagu arst on soovitanud. Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

- **Võtke alati täisannus,** nagu arst on määranud. Ärge kunagi võtke ainult osa tabletist.

Samuti võib arst soovitada, et te alustaksite või lõpetaksite teiste ravimite võtmise, sõltuvalt sellest, millist haigust teil ravitakse ning kuidas te ravile reageerite.

Kui te võtate lamotrigiini rohkem, kui ette nähtud

→ **Võtke otsekohe ühendust arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.** Võimalusel näidake neile Lamotrigiini pakendit.

Kui te võtate liiga palju **lamotrigiini, võivad suurema tõenäosusega tekkida tõsised kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga.** Kui Lamotrigiini on võetud liiga palju, võivad tekkida järgmised sümptomid:

- kiired, kontrollimatud silmaliigutused (*nüstagm*),
- kohmakus ja koordinatsioonihäired, mis mõjutavad tasakaalu (*ataksia*),
- südame rütmihäired (mida tavaliselt näitab EKG),
- teadvuse kadu, krambid (hood) või kooma.

Kui te unustate lamotrigiini ühe annuse võtta

→ **Ärge võtke lisatablette, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal.**

Kui te unustate lamotrigiini mitu annust võtta

→ **Küsige oma arstilt nõu selle kohta, kuidas alustada uuesti ravimi võtmist.** Seda on tähtis teha.

Ärge lõpetage lamotrigiini võtmist ilma soovituseta

Lamotrigiini tuleb võtta nii kaua, kui arst soovib. Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui võtate lamotrigiini epilepsia raviks

Kui te lõpetate Lamotrigiini võtmise, **on tähtis vähendada järk-järgult ravimi annust**, ligikaudu 2 nädala jooksul. Kui te lõpetate järsku Lamotrigiini võtmise, võib epilepsia taastuda või süveneda.

Kui võtate lamotrigiini bipolaarse häire raviks

Lamotrigiini toime avaldumiseks võib kuluda natuke aega, seega ei ole tõenäoline, et te tunnete ennast otsekohe paremini. Kui te lõpetate Lamotrigiini võtmise, ei ole vaja annust järk-järgult vähendada. Ent kui te soovite Lamotrigiini võtmist lõpetada, pidage siiski kõigepealt nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Potentsiaalselt eluohtlikud reaktsioonid: te vajate kohest arstiabi

Väikesel arvul lamotrigiini võtvatest inimestest tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt eluohtlik nahareaktsioon, mis ravita jätmisel võib areneda tõsisemateks probleemideks.

Taolised sümptomid võivad kõige tõenäolisemalt ilmneda Lamotrigiini ravi esimeste kuude kestel, eriti kui ravi alustamise annus on liialt suur või suurendatakse annust liiga kiiresti või kui Lamotrigiini võetakse samaaegselt teise ravimiga, mille nimi on *valproaat*. Mõningad neist sümptomitest ilmnevad sagedamini laste puhul, seega peaksid vanemad eriti hoolikalt nende suhtes valvel olema.

Nende reaktsioonide sümptomid on järgmised:

- **nahalööbed või –punetus**, mis võivad areneda eluohtlikeks nahareaktsioonideks, kaasa arvatud massiline nahalööve koos villide ja nahakihi irdumisega, mis ilmneb eriti just suu, nina, silmade ja genitaalide piirkonnas (*Stevensi-Johnsoni sündroom*), ulatuslik nahakihi irdumine (enam kui 30% kehapiinal – *toksiline epidermaalne nekroolüüs*) või ulatuslik nahalööve koos maksa, vere ja teiste organite haaratusega (reaktsioon ravimile koos

eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, mida teatakse ka kui DRESS ülitundlikkuse sündroomina),

- **haavandid suus, kõris, ninas või suguelunditel,**
- **kurguvalu või punased või turses silmad** (*konjunktiviit*),
- **kõrge kehatemperatuur** (palavik), gripitaolised sümptomid või uimasus,
- **näo turse** või **lümfisõlmede suurenemine** kaelal, kaenlaalustes või kubemes,
- **ootamatu verejooks või verevalumite teke** või sõrmede tõmbumine siniseks,
- **kurguvalu** või nakkuste (nt külmetushaiguste) tavalisest sagedasem esinemine,
- maksaensüümide aktiivsuse tõus, mida saab tuvastada vereanalüüsiga,
- teatud tüüpi valgevererakkude (eosinofiilid) arvu tõus,
- lümfisõlmede suurenemine,
- organite haaratus, sh maks ja neerud.

Paljudel juhtudel on need sümptomid vähemtõsiste kõrvaltoimete ilmingud. **Kuid te peate olema teadlik, et need on potentsiaalselt eluohtlikud ja võivad areneda tõsisemateks probleemideks,** nagu organpuudulikkus, kui need ravita jätta. Kui te täheldate ükskõik millist neist sümptomitest:

- ➔ **Pöörduge niipea kui võimalik arsti poole.** Arst võib otsustada teha analüüsid maksa-, neeru- või verenäitajate kontrollimiseks ning öelda teile, et lõpetaksite Lamotrigiini võtmise. Kui teil tekib Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs, ütleb arst teile, et te ei tohi enam kunagi lamotrigiini võtta.

Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) (vt lõik 2 „Mida on vaja teada enne Lamotrigiini võtmist“).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida **rohkem kui ühel inimesel 10-st:**

- peavalu,
- nahalööve.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida **kuni ühel inimesel 10-st:**

- agressiivsus või ärrituvus,
- unisus või uimasus,
- pearinglus,
- värisemine ehk treemor,
- unehäired (*unetus*),
- ärevus,
- kõhulahtisus,
- suukuivus,
- iiveldus või oksendamine,
- väsimus,
- selja-, liigese- või muu valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida **kuni ühel inimesel 100-st:**

- kohmakus ja koordinatsioonihäired (*ataksia*),
- kahelinägemine või ähmane nägemine,
- ebaharilik juuste väljalangemine või hõrenemine (alopeetsia),
- nahalööve või päikesepõletus pärast otseses päikese- või tehisvalguses viibimist (fotosensitiivsus).

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida **kuni ühel inimesel 1000-st:**

- eluohtlik nahareaktsioon (*Stevensi-Johnsoni sündroom*) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
- üheskoos esinev sümptomite grupp, sh:
palavik, iiveldus, oksendamine, peavalu, kaelakangestus ja äärmiselt suur tundlikkus ereda valguse suhtes.

See võib olla põhjustatud aju- ja seljaaju ümbritsevate kelmete põletikust (*meningiit*). Need sümptomid tavaliselt kaovad pärast ravi katkestamist, kuid kui sümptomid püsivad või süvenevad, siis **võtke ühendust oma arstiga**,

- kiired, kontrollimatud silmaliigutused (*nüstagm*),
- silmade sügelus koos eritusega silmadest ja koorikute tekkega silmalaugudel (*konjunktiviit*).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida **kuni ühel inimesel 10 000-st**:

- eluohtlik nahareaktsioon (*toksiline epidermaalne nekroliis*) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
- reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
- kõrge kehatemperatuur (*palavik*) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
- näo turse (*ödeem*) või lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenlaalustes või kubemes (*lümfadenopaatia*) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
- maksatalitluse muutused, mida näitavad vereanalüüsid, või maksapuudulikkus (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
- tõsine vere hüübimishäire, mis võib põhjustada ootamatut verejooksu või verevalumite teket (*dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon*) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
- hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) (vt lõik 2 „Mida on vaja teada enne Lamotrigiini võtmist“),
- muutused vereanalüüsides – sealhulgas punavereliblede arvu langus (*aneemia*), valgevereliblede arvu langus (*leukopeenia, neutropeen, agranulotsütoos*), vereliistakute arvu langus (*trombotsütopeen*), kõikide vererakkude arvu langus (*pantsütopeen*) ja luuüdi haigus, mida nimetatakse *aplastiliseks aneemiaks*,
- hallutsinatsioonid (asjade „nägemine“ või „kuulmine“, mida ei ole tegelikult olemas),
- segasus,
- vankumise või ebakindluse tunne ringi liikudes,
- kontrollimatud kehaliigutused (*tikid*), kontrollimatud lihasspasmid silmades, peas ja keres (*koreoatetoos*) või muud ebataolised liigutused, nagu tõmbused, värisemine või jäikus,
- epilepsiaga inimestel hoogude sagenemine,
- olemasoleva Parkinsoni tõvega patsientidel haigusnähtude süvenemine,
- luupusetaoline reaktsioon (sümptomid võivad olla järgmised: selja- või liigesvalu, millega mõnikord kaasnevad palavik ja/või üldine haiglane enesetunne).

Muud kõrvaltoimed

Muud kõrvaltoimed on ilmnunud väikesel arvul inimestel, aga nende täpne sagedus on teadmata:

- Teatatud on luuhäiretest, sh osteopeeniast ja osteoporoosist (luuhõrenemine) ning luumurdudest. Kui te saate krambivastast ravi pikka aega, teil on olnud luuhõrenemine või te kasutate steroide, pidage oma arsti või apteekriga nõu.
- Neerupõletik (*tubulointerstitiaalne nefriit*) või neerupõletik koos silmapõletikuga (*tubulointerstitiaalse nefriidi ja uveiidi sündroom*).
- Öudusunenäod.
- Nõrgenenud immuunsus, sest teid nakkuste vastu kaitsvate antikehade, immunoglobuliinide sisaldus veres on väiksem.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.raviamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Lamotrigiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistritel, karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud 07.2024