

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zolmitriptaan, 2,5mg, tahke suukaudne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on zolmitriptaan ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne zolmitriptaani kasutamist
3. Kuidas zolmitriptaani kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas zolmitriptaani säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on zolmitriptaan ja milleks seda kasutatakse

Zolmitriptaan kuulub 5HT₁-retseptorite agonistide ravimgruppi, mida kasutatakse migreeni raviks, kuna see avaldab toimet nendele aju piirkondadele, mis on haaratud migreenihoo ajal. Zolmitriptaani kasutatakse migreeni raviks migreenihoo ajal. Seda ei tohi kasutada migreenihoo ärahoidmiseks.

2. Mida on vaja teada enne zolmitriptaani kasutamist

Ärge kasutage zolmitriptaani

- kui teil on teadaolevalt ülitundlikkus zolmitriptaani või ravimi mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on kõrge vererõhk, mis ei allu ravile.
- kui teil on isheemiatõbi, südame pärgarterite haigus (verevoolu häired südamearterites), teatud liiki valud rinnus, mida tuntakse Prinzmetali rinnaangiinina ehk stenokardiana või teil esineb südamehaiguste suurenenud tekkeoht.
- kui teil on olnud ajurabandus või transitoorne isheemiline atakk (TIA) – infot selle kohta küsige oma arstilt.
- kui te kasutate samaaegselt teisi zolmitriptaaniga sama tüüpi migreenihoo ravimeid, nagu 5HT₁ retseptori agonistid või ergotamiini või ergot-tüüpi toimeainega ravimeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne tablettide võtmist rääkige oma arstile, kui:

- teil on olnud südamehaigusi, nagu rinnaangiin (stenokardia), südamelihase infarkt (südameatakk), ajurabandus või hüpertensioon (kõrge vererõhk).
- teile on öeldud, et teil võib olla kõrgenenud risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse.
- teile on öeldud, et teil on Wolffi-Parkinsoni-White'i sündroom (südame rütmihäire).
- teil on varem esinenud probleeme maksaga.

- te kasutate oma migreeni ravimiseks teisi ravimeid või kui te kasutate depressiooni ravimiseks mõeldud ravimeid (vt „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

Kui lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali, et kasutate zolmitriptaani.

Lapsed ja noorukid

Zolmitriptaani ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Eakad

Zolmitriptaani ei soovitata kasutada üle 65-aastastel isikutel.

Muud ravimid ja zolmitriptaani

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui zolmitriptaani kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

Teised migreenihoo ravimid:

- ravimiga zolmitriptaan sama tüüpi ravimid (5HT1 agonistid/serotoniini agonistid/triptaanid). Nende ravimite ning zolmitriptaani manustamise vahele peab jääma vähemalt 24 tundi, samuti ei tohi neid ravimeid enne võtta, kui zolmitriptaani manustamisest on möödas 24 tundi;
- ergotamiini või ergot-tüüpi toimeainet sisaldavad ravimid (näiteks dihidroergotamiin või metüsergiid). Nende ravimite tarvitamise järel ei tohi zolmitriptaani võtta 24 tunni jooksul, pärast zolmitriptaani kasutamist ei tohi neid ravimeid võtta 6 tunni jooksul.

Depressiooniravimid:

- MAO-A inhibiitorid, näiteks moklobemiid;
- ravimid, mis kuuluvad SSRI (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) rühma, näiteks fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, fluvoksamiin;
- ravimid, mis kuuluvad SNRI (selektiivsed serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid) rühma, näiteks venlafaksiin, duloksetiin.

Teised ravimid:

- tsimetidiin (seedehäirete või haavandtõve raviks);
- kinolooni rea antibiootikumid (näiteks tsiprofloksatsiin).

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos zolmitriptaaniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt ei mõjuta zolmitriptaan teie võimet juhtida autot või töötada seadmetega. Siiski peaksite veenduma, kuidas zolmitriptaan teile toimib, enne kui alustate nimetatud tegevusi.

3. Kuidas zolmitriptaani kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Tavaline annus on üks tablett (2,5 mg) manustatuna kohe pärast migreenihoo algust.
- Kui teil kahe tunni möödudes on ikka veel migreenihoog või see kordub 24 tunni jooksul, võtke teine tablett.
- Kui need tabletid piisavalt ei aidanud, rääkige sellest oma arstile, sest ta võib soovida teie ravi muuta.

Kui te võtate zolmitriptaani rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te lõpetate zolmitriptaani võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka zolmitriptaan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Zolmitriptaan võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

- kõhuvalu;
- haiglane enesetunne;
- oksendamine;
- uimasus;
- peavalu;
- unisus;
- kuumatunne;
- nõrkustunne;
- suukuivus;
- raskus-, pigistus-, valu- või survetunne kurgus, kaelas, rinnas, kätes või jalgades;
- lihasvalu;
- pakitsus sõrmedes ja varvastes;
- neelamisraskused;
- südame pekslemine.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- südame löögisageduse tõus;
- mööduv vererõhu tõus;
- uriini hulga suurenemine;
- urineerimise sagedus.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

- allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid sealhulgas urtikaaria ehk nõgestõbi, angioödeem (turse suu, keele või kaela piirkonnas) ja rasked allergilised reaktsioonid (anafülaksia).

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

- rinnaangiin (stenokardia);

- südame pärgarterite spasm;
- südamelihase infarkt;
- verine kõhulahtisus;
- seedetrakti ja põrna veresoonte spasm, mis võib põhjustada soole- või põrnainfarkti.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas zolmitriptaani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja:

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2024