**PAKENDI INFOLEHT**
**prasosiin, 1 mg tabletid**
**prasosiin, 2 mg tabletid**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.**

## 1. KOOSTIS

Üks tablett sisaldab:

**Toimeained:**
Prasosiin 1 mg (1 mg tablett)
2 mg (2 mg tablett)

## 2. LOOMALIIGID

Koer, kass.

## 3. NÄIDUSTUSED

Koer
Ureetra sfinkterite lõõgastamine detruusor-ureetra düssünergia korral.

Kass
Ureetra silelihaste spasmide leevendamine idiopaatilise tsüstiidi korral.

## 4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, teiste kinasoliinide (nt tamsulosiin) või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

## 5. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud ravimi ohutuks kasutamiseks loomaliikidel

Ravimit tuleb kasutada ettevaatusega loomadel, kellel esineb hüpotensioon või mõni muu seisund, mille korral hüpotensiooni tekkimine võib viia raskete tagajärgedeni.

Tiinus ja laktatsioon

Uuringutes rottidega, kellele manustati 225 korda maksimaalsest soovituslikust suuremaid annuseid, esines pesakonna suuruse vähenemist, kuid rottidel ega küülikutel ei ole täheldatud loote väärarenguid.
On teada, et inimestel eritub prasosiin väikestes kogustes rinnapiima, kuid mõju järglastele ei ole kindlaks tehtud.

Kuna ravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud, tuleb seda kasutada ainult juhul, kui eeldatav kasu emasloomale on suurem kui võimalikud negatiivsed mõjud järglastele.

Sigivus

Koertega ja rottidega tehtud uuringus täheldati manustamisel ühe aasta jooksul annuses 25 mg/kg päevas munandite atroofiat ja nekroosi ning isasrottidel, kellele manustati 75 mg/kg päevas, täheldati viljakuse vähenemist.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne kasutamine alljärgnevas loetelus nimetatud ainetega ei pruugi olla tingimata vastunäidustatud, kuid vajalik on iga patsiendi puhul võimalikku kasu-riski suhet hinnata.

Atsepromasiini, alfa-2 agonistide (nt deksmedetomidiin), kaltsiumkanali blokaatorite, diureetikumide (nt furosemiid, hüdroklorotiasiid), angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite (AKE-d; nt benasepriil, enalapriil), pentoksüfülliini ja sildenafiili samaaegne manustamine võib suurendada hüpotensiooni riski.

Klonidiin, kortikosteroidid (nt deksametasoon, fludrokortisoon, prednisoloon, prednisoon) ja mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt karprofeen, meloksikaam, robenakoksiib) võivad vähendada prasosiini antihüpertensiivset toimet.

Beetablokaatorid (nt propranolool) võivad suurendada prasosiini esimese annuse järgselt täheldatud posturaalset hüpotensiivset toimet.

Sümpatomimeetikumid (nt dopamiin, norepinefriin, fenüülpropanoolamiin) võivad vähendada üksteise toimet. Kassidel vähendab prasosiin adrenaliini mõju arteriaalsele vererõhule.

Üleannustamine

Rottidel on suukaudne $LD_{50}$ 1950 mg/kg.
Koertel on prasosiini üleannustamisega seotud kliinilisteks tunnusteks hüpotensioon, tahhükardia, ataksia, letargia ja värisemine. Kassidel on kõige sagedasemaks sümptomiks hüpotensioon.

Akuutse üleannustamise korral, kui kliinilisi tunnuseid veel ei esine, tuleks alustada seedetrakti dekontaminatsiooniga (nt oksendamise esilekutsumine, aktiivsöe manustamine). Elutähtsaid näitajaid, sh südame löögisagedust ja vererõhku, tuleb hoolikalt jälgida. Hüpotensiooni tuleb ravida veremahu suurendajatega ja kui veremahu suurendajatele ei reageerita, tuleb kasutada vererõhku tõstvaid aineid (nt norepinefriin). Kui teistele vasopressoritele on ravivastus minimaalne, võib olla vajalik vasopressiini manustamine. Neerufunktsiooni tuleb jälgida ja pidevalt toetada. Lipiidide emulsioonid ei ole prasosiini puhul eeldatavasti efektiivsed, kuigi nende kliinilist kasutamist ei ole kirjeldatud. Suure valkudega seondumise tõttu on prasosiini eemaldamine hemodialüüsiga minimaalne, aga aktiivsöe hemoperfusioon ja plasmavahetus võivad olla tõhusad raske toksilisuse ravis.

Üleannustamise või selle kahtluse korral tuleb viivitamatult konsulteerida veterinaararstiga.

## 6. KÕRVALTOIMED

Eksperimentaalses uuringus koertega, kellele manustati prasosiini annuses 0,025 mg/kg intravenoosselt, põhjustas see süstoolse, diastoolse ja keskmise arteriaalse vererõhu olulist langust, kuid selle kliiniline tähtsus urineerimishäirete ravi korral ei ole teada.
Muude teatatud kõrvaltoimete hulka kuuluvad kesknärvisüsteemi toimed (nt letargia, pearinglus, mis on tavaliselt mööduv), seedetrakti toimed (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, hüpersalivatsioon, isutus) ja silma pilkkile nähtavale jäämine.

Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada mis tahes kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

## 7. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIISID JA –MEETOD

Suukaudne manustamine.

Koer
Ureetra sfinkterite lõõgastamine väljavoolu funktsionaalse takistuse korral: 0,5–3 mg/koer suukaudselt iga 8–12 tunni järel.

Kass
Ureetra sfinkterite lõõgastamine väljavoolu funktsionaalse takistuse korral: 0,25–1 mg/kass suukaudselt iga 12 tunni järel 1–2 nädala jooksul.

Soovitused õige manustamise osas
Ravimit võib anda nii koos toiduga kui ilma. Kui pärast ravimi andmist tühja kõhuga loomale tekib oksendamine, võib järgmisel korral manustada ravimit koos toiduga ja jälgida, kas selline manustamine on loomale paremini talutav. Kui oksendamine tekib uuesti või jätkub, tuleb konsulteerida veterinaararstiga.

## 8. KEELUAJAD

Ei rakendata.

## 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitamistingimusi vaata pakendilt.
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## 10. ERINÕUDED HÄVITAMISEKS

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme.
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
Küsige oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.

## 11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2026

## 12. LISAINFO

**Müügiloata ravim**