PAKENDI INFOLEHT
proksümetakaiin, 5 mg/ml silmatilgad, lahus

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. KOOSTIS

Üks ml sisaldab:

Toimeained:
Proksümetakaiin 5 mg

2. LOOMALIIGID

Koer, kass ja hobune (muu kui toiduloom)

3. NÄIDUSTUSED

Silma lokaalne anesteesia.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte kasutada terapeutilisel eesmärgil silmaga seotud valu vaigistamiseks, kuna korduv või pikaajaline kasutamine põhjustab sarvkesta epiteeli ja strooma kahjustusi ning pisarakile ebastabiilsust, mis võib viia nägemise kaotuseni.

5. ERIHOIATUSED

Puuduvad.

6. KÕRVALTOIMED

Proksümetakaiini okulaarsel manustamisel võib mitme tunni jooksul pärast manustamist esineda lokaalne ärritus. Kuigi teiste lokaalanesteetikumide suhtes tundlikel loomadel võib olla proksümetakaiini suhtes väiksem reaktsioon, võib lokaalne või süsteemne tundlikkus avalduda pseudoallergilise (anafülaktoidse) reaktsioonina, mis jäljendab IgE-vahendatud vasodilatatoorseid nähte. Teiste lokaalanesteetikumide põhjustatud kardiovaskulaarsed, hingamissüsteemi ja kesknärvisüsteemi pärssivad toimed on lokaalanesteetikumide õige kasutamise korral äärmiselt haruldased. Proksümetakaiini manustamisel väikestele loomadele (st kutsikad, kassipojad, kääbustõud) tuleb siiski olla ettevaatlik.
Proksümetakaiini kasutamine terapeutilise valuvaigistina põhjustab pindmist punktkeratiiti, mis võib progresseeruda difuusseks nekrotiseerivaks keratiidiks, raskeks infiltratiivseks keratiidiks, püsivateks epiteeli defektideks või Descemeti membraani kahjustuseks.

Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada mis tahes kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

7. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIISID JA –MEETOD

Okulaarne manustamine.

Lokaalanesteesia oftalmoloogilistel protseduuridel: 1–2 tilka silma enne uuringut või protseduuri. Ravimi manustamist võib vajadusel korrata, manustades 1 tilga iga 5–10 minuti järel maksimaalselt 2–3 korda. Korduva manustamisega saab sarvkesta anesteesia kestust koertel pikendada 55 minutini.
Väikestel loomadel (nt kutsikad, kassipojad, kääbustõud) tuleks korduvat manustamist vältida.

8. KEELUAJAD

Koer, kass:
Ei rakendata.

Hobune (muu kui toiduloom):
Ravitud hobuste tapmine inimtoiduks kasutamise eesmärgil on keelatud.
Vastavalt siseriiklikule seadusandlusele peab hobuslaste passis olema deklareeritud, et hobune ei ole ette nähtud inimtoiduks tapmiseks.
Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitamistingimusi vaata pakendilt.
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

10. ERINÕUDED HÄVITAMISEKS

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme.
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
Küsige oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2026

12. LISAINFO

Müügiloata ravim