**PAKENDI INFOLEHT**
**tobramütsiin, 3 mg/ml silmatilgad, lahus**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.**

## 1. KOOSTIS

Üks ml sisaldab:

**Toimeained:**
Tobramütsiin 3 mg

## 2. LOOMALIIGID

Koer, kass, küülik (muu kui toiduloom) ja närilised.

## 3. NÄIDUSTUSED

Toimeainele tundlike bakterite põhjustatud pindmiste okulaarsete infektsioonide ravi.

## 4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, teiste aminoglükosiidide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

## 5. ERIHOIATUSED

Kokkusobimatus

Tobramütsiini sisaldavaid okulaarseid lahuseid ei tohi segada teiste okulaarselt manustatavate lahustega.

## 6. KÕRVALTOIMED

Loomadel on tobramütsiini okulaarsel manustamisel täheldatud silmade ärritust, mittespetsiifilist konjunktiviiti, konjunktiivi epiteeli defekte ja konjunktiivi hüpereemiat.

Tobramütsiini süsteemsel kasutamisel võib see põhjustada nefrotoksilisust ja neurotoksilisust (ototoksilisust ja vestibulaarset toksilisust). Kuna kassid on aminoglükosiidide toksiliste mõjude suhtes vastuvõtlikumad, on soovitatav kõiki kasse, kellele manustatakse tobramütsiini paikselt, jälgida süsteemse toksilisuse tunnuste suhtes.

Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada mis tahes kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

## 7. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIISID JA –MEETOD

Okulaarne manustamine.

Toimeainele tundlike bakterite põhjustatud pindmised infektsioonid: 1 tilk tabandunud silma(desse) 4–6 korda päevas. Raskekujuliste infektsioonide raviks võib ravimit manustada sagedamini, iga 30–60 minuti järel.

## 8. KEELUAJAD

Koer, kass, närilised:
Ei rakendata.

Küülik (muu kui toiduloom):
Ravitud loomi ei tohi tarvitada inimtoiduks.

## 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitamistingimusi vaata pakendilt.
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## 10. ERINÕUDED HÄVITAMISEKS

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme.
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
Küsige oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.

## 11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2026

## 12. LISAINFO

**Müügiloata ravim**