PAKENDI INFOLEHT
tropikamiid, 5 mg/ml silmatilgad, lahus

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. KOOSTIS

Üks ml sisaldab:

Toimeained:
Tropikamiid 5 mg

2. LOOMALIIGID

Koer, kass ja hobune (muu kui toiduloom).

3. NÄIDUSTUSED

Müdriaasi tekitamine diagnostilisel eesmärgil.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte kasutada primaarse glaukoomi korral, kuna silma siserõhk võib suureneda.

5. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud ravimi ohutuks kasutamiseks loomaliikidel

Ravimit tuleb kasutada ettevaatusega loomadel, kellel võib olla eelsoodumus glaukoomi kujunemisele (kõrge riskiga tõud, eelnevalt diagnoositud glaukoom teises silmas).

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravim põhjustab pupillide laienemist. Vältida ravimi sattumist silma, sealhulgas käega silma viimist.
Pärast ravimi manustamist pesta hoolikalt käed.

Koostoime teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne kasutamine alljärgnevas loetelus nimetatud ainetega ei pruugi olla tingimata vastunäidustatud, kuid vajalik on iga patsiendi puhul võimalikku kasu-riski suhet hinnata.

Antikolinergilised ained (nt antihistamiinikumid, atropiin, glükopürrolaat) võivad suurendada antikolinergiliste toimete (nt müdriaas, tahhükardia) tekkimise riski.

Okulaarselt manustatavad kolinergiliste ainete (nt demekaarium, pilokarpiin) samaaegne manustamine võib vähendada iga ravimi terapeutilist toimet.

Süsteemselt manustatavad kolinergilised ained (nt betanekool, füsostigmiin, püridostigmiin) võivad vähendada tropikamiidi antikolinergilist toimet.

Kokkusobimatus

Tropikamiidi ei tohiks segada ühegi teise okulaarselt manustatava ravimiga.

6. KÕRVALTOIMED

Koertel ja kassidel võib esineda hüpersalivatsiooni, mida seostatakse ravimi kibeda maitsega. Samuti võib kassidel ja koertel tekkida silmasisese rõhu suurenemine.
Kassidel ja hobustel võib pärast tropikamiidi silmatilkade manustamist pisarate tootmine väheneda mitmeks tunniks.

Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas infolehes mainitud, või arvate, et ravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada mis tahes kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

7. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIISID JA –MEETOD

Okulaarne manustamine.

Müdriaasi tekitamine silmapõhjade uurimise hõlbustamiseks: 1–2 tilka uuritavasse silma, ravimi manustamist korrata 5 minuti pärast.

Müdriaasi tekitamine pärast katarakti eemaldamise operatsiooni: 1–2 tilka kahjustatud silma(desse) üks kuni kaks korda päevas pärast operatsiooni.

8. KEELUAJAD

Koer, kass:
Ei rakendata.

Hobune (muu kui toiduloom):
Ravitud hobuste tapmine inimtoiduks kasutamise eesmärgil on keelatud.
Vastavalt siseriiklikule seadusandlusele peab hobuslaste passis olema deklareeritud, et hobune ei ole ette nähtud inimtoiduks tapmiseks.
Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitamistingimusi vaata pakendilt.
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

10. ERINÕUDED HÄVITAMISEKS

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme.
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Küsige oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2026

12. LISAINFO

Müügiloata ravim