

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Dezaminooksitocins tabletid *Demoksütotsiin*

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile

Infolehes antakse ülevaade

1. Mis ravim on Dezaminooksitocins ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Dezaminooksitocinsi kasutamist
3. Kuidas Dezaminooksitocinsi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Dezaminooksitocinsi säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON DEZAMINOOKSITOCINS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Demoksütotsiin on oksütotsiini (hüpopüüsi tagasagara hormooni) sünteetiline analoog. Ravim põhjustab emaka silelihaste ja piimanäärmete silelihasrakkude kokkutõmbeid. Demoksütotsiin omab tugevamat ja kestvamat toimet võrreldes oksütotsiiniga ja on vastupidavam fermentatiivse inaktivatsiooni suhtes (oksütotsinaasile).

Demoksütotsiinil puuduvad vasopressoorne ja antidiureetiline toime, mis võimaldab ravimit kasutada ka hüpertensiooniga patsientidel ning raseduse teise poole toksikooside ja neerufunktsiooni häirete korral.

Ravim ei lõhustu suljefermentide toimel ja imendub hästi läbi suu limaskestast.

Demoksütotsiini kasutatakse sünnitustegevuse esilekutsumiseks meditsiinilisel näidustusel, sünnitustegevuse stimuleerimiseks, emaka taandarengu (involutsiooni) kiirendamiseks sünnitusjärgsel perioodil ja pärast aborti, laktatsiooni (piima eritumise) stimuleerimiseks ja mastiidi (rinnapõletik) profülaktikaks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DEZAMINOOKSITOCINSI KASUTAMIST

Ärge võtke ravimit

- kui te olete allergiline (ülitundlik) demoksütotsiinile või Dezaminooksitocinsi mõne koostisosa suhtes
- kui sünnitus loomulikul teel ei ole soovitatud või on vastunäidustatud
- kui on liiga tugevad tuhud

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Beeta-adrenomimeetilised ravimid võivad vähendada demoksütotsiini stimuleerivat toimet emakale. Samaaegselt demoksütotsiiniga ei tohi kasutada teisi sarnase toimega ravimeid.

Oluline teave mõningate Dezaminooksitocinsi koostisainete suhtes

Ravim sisaldab abiainetena sahharoosi ja laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. KUIDAS DEZAMINOOKSITOCINSI KASUTADA

Sünnitus^{te}gevuse esilekutsumiseks ja stimuleerimiseks võetakse ravimit 50 IU (1 tablett) 30 minutilise vahega. Regulaarse sünnitustegevuse saavutamisel annust vähendatakse poole võrra (0,5 tabletti) või pikendatakse intervalli ravimi annuste vahel (1 tund).

Maksimaalne annus on 500 IU (10 tabletti), harvadel juhtudel kuni 900 IU. Toime puudumisel maksimaalse annuse kasutamisel minnakse üle oksütotsiini süstelahuse manustamisele veenisiseselt.

Laktatsiooni stimuleerimiseks on tavaline annus 25...50 IU (0,5...1 tablett), 5 minutit enne imiku toitmist, 2...4 korda ööpäevas, 2...6 päeva pärast sünnitust.

Toimeaine imendumine toimub läbi suu limaskesta.

Tabletid hoitakse suus (ilma vedelikuta), kuni täieliku imendumiseni.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Dezaminooksitocins põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On täheldatud iiveldust, oksendamist, südame rütmihäireid, emaka hüpertoonilisust, sünnitustegevuse liigset tugevust ja sellest tingitud loote emakasisest asfüksiat.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS DEZAMINOOKSITOCINSI SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Dezaminooksitocinsi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Dezaminooksitocins sisaldab

Toimeaine on demoksütotsiin. Üks tablett sisaldab 50 IU demoksütotsiini.

Abiained on sahharoos, laktoos, tärklis, kaltsiumstearaat, metüültselluloos.

Pakendi sisu

Dezaminooksitocins 50 IU tabletid imemiseks suus ilma vedelikuta kuni täieliku imendumiseni.
Blisterpakendis 10 tabletti.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Tootja

AS Grindeks
Krustpils 53
Riga
LV-1057, Läti

Infoleht on viimati koostöölstatud aprillis 2008