

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Epinefriin, 1mg/ml; 1,8mg/ml, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on epinefriin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne epinefriini kasutamist
3. Kuidas epinefriini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas epinefriini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on epinefriin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine epinefriin on katehoolamiinide hulka kuuluv hormoon. Alfa-adrenoretseptorite stimuleerimise kaudu on epinefriinil on tugev veresooni ahendav ja seeläbi turset vähendav toime. Beeta-adrenoretseptorite stimuleerimise kaudu on epinefriinil tugev bronhe (hingamisteid) lõõgastav toime.

Epinefriini kasutatakse ägeda obstruktiivse kõripõletiku (krupi) korral.

2. Mida on vaja teada enne epinefriini kasutamist

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on epinefriini kasutamisel vajalik:

- patsiendil, kes on selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline,
- patsiendil, kellel on mis tahes südamehaigus,
- šoki korral,
- patsiendil, kelle aju veresooneid on kahjustatud,
- glaukoomi korral (silma sisese rõhusuurenemine),
- patsiendil, kellele teostatakse operatsiooni üldanesteesias,
- sünnituse viimases staadiumis,
- kui patsiendil on kõrge vererõhk,
- raseduse ja rinnaga toitmise korral,
- diabeetikutel.

Muud ravimid ja epinefriin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui epinefriini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- Antihistamiinsed ained (kasutatakse allergiate korral).
- Ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja südamehaiguste korral.
- Ravimid, mida kasutatakse depressiooni ja kilpnäärne haiguste korral.
- Tungaltera alkaloidid (kasutatakse migreeni korral).
- Insuliin ja suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid (kasutatakse diabeedi korral)
- Oksütotsiin (kasutatakse sünnitustegevuse intensiivistamiseks)
- Doksapraam (kasutatakse raskete hingamisprobleemide korral)
- Entakapoon (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks)
- Antipsühhootikumid (kasutatakse raskete vaimse tervise häirete korral)

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos epinefriiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et epinefriin mõjutaks autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas epinefriini kasutada

Epinefriini manustatakse tervishoiutöötaja poolt.

Kõriturse korral kasutatakse epinefriini inhalatsiooni: 2,5 ml (1 mg/ml) lahustatuna 3 ml NaCl 0,9% lahuses.

(Lisaks manustada metüülprednisolooni).

Kui te kasutate epinefriini rohkem kui ette nähtud

Epinefriini manustatakse tervishoiutöötaja poolt, mistõttu on üleannustamine vähetõenäoline.

Epinefriini üleannustamise sümptomiteks on vererõhu tõus, mis võib põhjustada aju verejooksu. Tulenevalt perifeerses vasokonstriksioonist (väikeste veresoonte ahenemisest) samaaegselt kardiostimulatsiooniga (südame töö intensiivistumisega) võib tekkida kopsuturse, mis võib põhjustada surma. Kopsuturse ja hingamisraskuste korral manustada kiire toimelist alfa-adrenoblokaatorit. Eluohtlike südame rütmihäirete korral manustada beeta-blokaatorit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Epinefriin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Ärevus
Hingamisraskused
Veresuhkru taseme tõus
Vererõhu tõus
Südame pekslemine
Värisemine (treemor)

Nõrkus
Peavalu
Sõrmede ja varvaste külmetamine
Iiveldus
Oksendamine
Liigne higistamine
Ajusisene verejooks, mille sümptomite hulka kuuluvad tugev peavalu, kaela kangus, teadvuse kadu (subarahnoidaalne hemorraagia)
Ühe kehapoole halvatus (hemipleegia)

Parkinsoni tõve korral võib epinefriini kasutamine süvendada lihaste rigiidsust ja värisemist.

Ravimi korduval manustamisel võib tekkida kudede kahjustus piirkonnas, kuhu ravimit manustati, samuti võib tekkida kudede kahjustus varvastes, sõrmedes, neerudes ja maksas.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas epinefriini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.