

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ledermix

Demeklotsükliin + triamtsinoloon, 30mg+10mg/g, dentaalpasta

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Ledermix ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Ledermix'i kasutamist
3. Kuidas Ledermix'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas ledermix'i säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on Ledermix ja milleks seda kasutatakse

Ravimis Ledermix sisalduv toimeaine demeklotsükliin on laia toimespektiga antibiootikum, mis omab toimet paljude mikroobide vastu. Teine ravimis Ledermix sisalduv toimeaine triamtsinoloon on kortikosteroid (hormoon), millel on põletikuvastane toime.

Ravimit Ledermix kasutatakse ägeda pulpiidi ja periodontiidi ennetamiseks ja raviks.

2. Mida on vaja teada enne Ledermix'i kasutamist

Ärge kasutage Ledermix'i:

- patsiendil, kes on demeklotsükliini või triamtsinoolooni või selle ravimi mis tahes koostisosade sh naatriumsulfiti suhtes allergiline,
- patsiendil, kes on kortikosteroidide suhtes allergiline,
- patsiendil, kes on tetratsükliinide suhtes allergiline,
- patsiendil, kellel on mädane pulpiit,
- rasedatel või last rinnaga toitvatel naistel,
- lastel vanuses alla 12-eluaasta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ledermix'is sisalduv abiaine naatriumsulfit võib harvadel juhtudel põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone ja hingamisraskusi.

Ledermix sisaldab kortikosteroidi. Kortikosteroididel on antiproliferatiivne (kudede kasvamist pärssiv) toime. Seetõttu ei tohi Ledermix'i jätta avatud pulbile kauemaks kui 2-3 päeva, kuna see võib põhjustada pulbi nekroosi. Kortikosteroididel on ka põletikuvastane toime. Seetõttu võib Ledermix'i kasutamisel suureneda kroonilise pulpiidi risk, kuna Ledermix'i kasutamisel väheneb põletikuliste protsesside pärssimise tulemusel pulbi loomulik vastupanuvõime infektsiooni tekitajatele.

Muud ravimid ja Ledermix

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ledermixi kasutamisel vastavalt soovitudele ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos Ledermix'iga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Ledermixi kasutamine koos toidu ja joogiga

Teie arst ütleb teile, kui pika aja jooksul pärast hambaravi protseduuri te süüa ja juua ei tohi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ledermix'i ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Triamtsinooloni ei soovitata kasutada raseduse 5 esimese kuu jooksul, kuna loomkatsed on näidanud teratogeenset toimet selle ravimi kasutamise korral raseduse esimesel poolel. Inimestega pole vastavaid uuringuid läbi viidud, mistõttu ei saa toimet inimestel välistada.

Lisaks imenduvad glükokortikoidid, sh triamtsinoolon, rinnapiima, seetõttu tuleb rinnaga toitmine peatada, kui Ledermix'i tuleb kasutada suurtes annustes või pikaajaliselt.

Demeklotsükliin läbib platsentaarbarjääri ja imendub rinnapiima. Kuna sellel ravimil on teratogeennne toime ja see ravim deponeerub luudes ja hammastes, siis ei tohi seda ravimit raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et Ledermix mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas Ledermix'i kasutada

Seda ravimit manustab teile hambaarst.

Ravimi annus ja täpne manustamisviis sõltub teie seisundist.

Ledermix pastat tohib kasutada ainult lühikese aja vältel (täpne ravimi kasutamise kestus sõltub konkreetse patsiendi seisundist).

Patsiendile tuleb selgitada, et väga oluline on tulla järgmisele visiidile õigeaegselt, et arst saaks ravimi eemaldada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ledermix võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga harva on teatatud allergilistest reaktsioonidest, sh anafülaktilisest šokist. Võimalik on ka ristreaktsioon teiste tetratsükliinidega.

Ka ravimis sisalduv naatriumsulfit on harvadel juhtudel põhjustanud raskeid allergilisi reaktsioone ja hingamistaskusi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Ledermix'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.