

## **PAKENDI INFOLEHT**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.**

### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on E-Z-CAT ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne E-Z-CAT kasutamist
3. Kuidas E-Z-CAT kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas E-Z-CAT säilitada
6. Lisainfo

## **E-Z-CAT, suukaudne suspension** Baariumsulfaat

### **1. MIS RAVIM ON E-Z-CAT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks

E-Z-CAT kasutatakse gastro-intestinaaltrakti uuringutel enne kompuutertomograafilist protseduuri.

Toimeaine on baariumsulfaat, mis on vees praktiliselt lahustumatu ja ei oma farmakoloogilist mõju.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE E-Z-CAT KASUTAMIST**

#### **Ärge kasutage E-Z-CAT'i:**

- kui te olete ülitundlik baariumsulfaadile või E-Z-CAT mõne koostisosa suhtes.

#### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Mõjusid autojuhtimis- ja masinate kasutamise võimele ei ole täheldatud

#### **Oluline teave mõningate E-Z-CAT koostisainete suhtes**

Ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab kaaliumit. Sellega tuleb arvestada kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Ravim sisaldab naatriumit. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

### **3. KUIDAS E-Z-CAT KASUTADA**

Kasutage E-Z-CAT alati vastavalt arsti juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on tunne, et E-Z-CAT toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

E-Z-CAT on suukaudseks manustamiseks.

*Täiskasvanud ja eakad :*

350 ... 450 ml lahjendatud suspensiooni juua 30 minutit enne protseduuri ja 5 ml suspensiooni hetk enne uuringut või nii nagu arst on soovitanud.

*Lapsed :*

E-Z-CAT kogus oleneb lapse vanusest ja kaalust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka E-Z-CAT põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetest on esinenud iiveldust ja harva kõhulahtisust või kõhukinnisust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

### **5. KUIDAS E-Z-CAT SÄILITADA**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Mitte hoida sügavkülmas.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.