

PAKENDI INFOLEHT

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Mixobar Colon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Mixobar Colon kasutamist
3. Kuidas Mixobar Colon kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Mixobar Colon säilitada
6. Lisainfo

Mixobar Colon, 1 g/ml, suukaudne ja rektaalsuspensioon Baariumsulfaat

1. MIS RAVIM ON MIXOBAR COLON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks

Mixobar Colon kasutatakse mao ja seedekulgla röntgenoloogilisel uuringul.

Toimeaine on baariumsulfaat, mis on vees praktiliselt lahustumatu. ja ei oma farmakoloogilist mõju .

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MIXOBAR COLON KASUTAMIST

Ärge kasutage Mixobar Colon't:

- kui te olete ülitundlik baariumsulfaadile või Mixobar Colon mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on mao või seedekulgla ummistus või perforatsioon

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõjusid autojuhtimis- ja masinate kasutamise võimele ei ole täheldatud

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline teave mõningate Mixobar Colon koostisainete suhtes

Ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS MIXOBAR COLON KASUTADA

Kasutage Mixobar Colon't alati vastavalt arsti juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on tunne, et Mixobar Colon toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kogus ja kontsentratsioon kohandatakse vastavalt patsiendi uuringule ja meetodile.

Topelt kontrast meetodiga jämesoole uuringuks manustatakse tavaliselt 300...750 ml lahjendatud (veega) või lahjendamata suspensiooni keha temperatuuri klistiirina kontsentratsiooni ulatustega 1 g/ml – 700 mg/ml.

Täitmismeetodiga jämesoole uuringuks manustatakse tavaliselt 1..2 l lahjendatud (veega) suspensiooni keha temperatuuri klistiirina kontsentratsiooni ulatustega 150...200 mg/ml.

Täitmismeetodiga mao uuringuks manustatakse tavaliselt (veega) lahjendatud suspensiooni suu kaudu kontsentratsiooniga 400...600 mg/ml.

Kogus vastavalt vajadusele, tavaliselt 100...200 ml.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Mixobar Colon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimetest on esinenud allergilisi reaktsioone ja harva kõhukinnisust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS MIXOBAR COLON SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida sügavkülmas.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.